

theorias, entretanto, disputando entre si a gloria de melhor explicar os phenomenos, e promovendo questões numerosas, e palpiantes de interesse scientifico.

Estas diversas theorias, sobre as quaes mais de espaço fallaremos, muito contribuíram com as suas calorosas discussões para os progressos que, ultimamente, tem feito a pathologia e a therapeutica das molestias syphiliticas, e venereas.

É sob o influxo da revolução scientifica, por que ora passa a syphilographia, que escrevemos as ideas, que hoje levamos á luz da publicidade; ideias que são o resultado, não só de algum estudo que sobre o assumpto fizemos, como também colhidas nas brilhantes e luminosas lecções que sobre a syphilis fizera o illustre oppositor da secção das sciencias cirurgicas, o Sr. Dr. Moura, na regencia da cadeira de Clinica Externa, mostrando-se, theorica e practicamente, defensor indefesso da doutrina dualista.

Nada ha de novo e de original no nosso escripto; bem raros são aquelles, que trazem o sello da originalidade, mormente em syphilographia, terreno assáz arroteado, e d'onde já tantas verdades pullularam inconcussas para os espiritos imparciaes e esclarecidos.

O nosso fim é mostrar que não tentamos, como comprehende muita gente, impugnar principios geralmente acceitos na sciencia; e nosso fim, como romeiro scientifico, é demandar, com fé e sem ideas preconcebidas, a verdade, onde quer que ella esteja, para acatar-mo-la; porque a verdade nem sempre se ha de furtar áquelles que, fervorosos, a buscam; pois cremos com o auctor da *Profession de foi du dix-neuvième siècle*, que: « *La vérité n'est pas la coupe banale qui passe de lèvre en lèvre à la table du festin. Elle est, elle doit toujours être une récompense. Pour avoir un droit sur elle il faut commencer pour la mériter.* »

(Continua.)

REGISTRO CLINICO.

NOTAS SOBRE UM CASO DE URETROTOMIA INTERNA.

Pelo Dr. M. M. Pires Caldas.

Antonio José, portuguez, solteiro, com 41 annos de idade, marinheiro, entrou para o hospital da Caridade no dia 20 de Abril deste anno, queixando-se de grande difficuldade de urinar, o que, ás mais das vezes, não fazia senão por gottas, não sendo, ainda assim, possível uma evacuação completa da hexiga.

No exame, apenas a uretra recebeu uma algalia flexivel de 2 millimetros de diametro; mas, continuada a dilatação gradual, chegou a admittir até a algalia de 3 millimetros, sendo custoso ir além d'este calibre; por isso, e pelo pouco tempo que podia demorar-se o doente no hospital, nos decidimos a praticar a incisão do estreitamento, a qual foi feita no dia 6 de Maio, em presença do Sr. Dr. Moura e dos estudantes que seguiam a sua Clinica, com o uretrotomo n.º 1 de Civiale, instrumento que, em virtude da dilatação primeiramente tentada, poudé atravessar a coarctação e incisal-a detraz para diante.

Quasi nenhuma hemorragia se seguiu á operação, e, sem que sonda alguma ficasse na uretra, o doente pouco depois urinou livremente; porém, foi logo accommettido de um accesso de frio, seguido de febre; que durou 48 horas, durante as quaes esteve em uso de uma mistura de alcoolatura de aconito e agoa.

Cumpre-nos observar que nós attribuímos a febre menos á operação do que ás tentativas, que foram feitas com o fim de passar pela uretra, immediatamente depois, uma algalia metalica volumosa; tanto assim que, dias antes da operação, a introduccão um pouco forçada de uma algalia metallica occasionou o mesmo effeito.

No dia 12 o doente recebeu uma algalia de estanho de 20 millimetros, e teve alta tres dias depois, podendo urinar perfeitamente.

CORRESPONDENCIA SCIENTIFICA.

Collega Redactor.—Lendo o noticiario do 1.º numero da *Gazeta Medica da Bahia*, na parte « *anesthesia local* », suscitou-se-me a lembrança de communicar-lhe o seguinte:

O apparelho do Dr. Richardson para produzir, pela congelação rapida do ether anestetico, a insensibilidade cutanea e local, acha-se em uso de minha clinica nesta cidade, e por meio d'elle tenho practicado pequenas operações sem o paciente sentir dôr.

A mais notavel que já practiquei no corrente mez foi a extracção d'um steatoma sublingual do tamanho d'um ovo de galinha, sem que a paciente sentisse dôr alguma no acto da dissecção. O insensibilizador, assim chamado por mim, foi applicado por duas vezes, com resultado perfeitamente satisfactorio, quanto a insensibilidade.

Com o seu emprego tenho practicado a extracção de dentes, sem dor alguma da parte do operado.