

O tumor furunculoso, meio flácido, foi aberto largamente por uma incisão feita pela ventral esquerda, dando sabida a grande quantidade de pus sanguinolento, mas inodoro. Applicaram-se vesicatorios ás pernas, e sinapismos por varias partes do corpo; continuou-se o tratamento estimulante, e deu-se o mesmo prognostico fatal.

Durante esse dia e no seguinte continuaram os symptommas a augmentar de intensidade; a respiração, que parecia ter melhorado momentaneamente pela evacuação do abcesso, continuou apressada e opprimida; a somnolencia foi passando ao coma, e a apathia das faculdades intellectuaes ao delirio; havia, de vez em quando, alguns esforços para vomitar, e, nas ultimas horas, contracções espasmodicas dos musculos, e, finalmente, movimentos convulsivos mais pronunciados. Na quarta feira, pouco antes de amanhecer, o doente expirou. Não houve suppressão da urina.

Tal foi, tambem, em substancia, a historia de todos os outros casos:—um diminuto ponto de suppuração; ou um ligeiro rubor erysipelatoso, apparecendo primeiro em alguma parte do corpo, em uma pessoa até então em estado de perfeita saude, e proseguindo por um ou dous dias, sem symptoma algum que desse logar á menor inquietação, quando, de subito, cahiu o doente no estado gravissimo acima descripto, que terminou fatalmente em poucas horas, e sem ser aparentemente influenciado por qualquer tratamento empregado.

RESENHA THERAPEUTICA.

Novo anesthesico.—O Doutor Smith acaba de apresentar como anesthesico o novo composto chlorocarbonado: é o tetrachlorido de carbono (C. Cl_4) que elle experimentou em muitos casos. De um cheiro agradavel, torva as inhalações faeeis; produz a insensibilidade em meio minuto sem exciação, nem perda completa de consciencia, o que o recommenda sobre tudo em obstrelicia. Seus efeitos anesthesicos se dissipam mui rapidamente e sem indisposição consecutivas; seu emprego interno e externo acalma a dores. Observa que so desprese sempre os succedaneos.—(*The Lancet*).

Contra-veneno do opio.—A primeira cousa a fazer-se, se o veneno está ainda no estomago, consiste na sua expulção pelo vomito ou pela sonda esophagiana.

Mas se o veneno é ja absorvido, e revela-se pelos seus efeitos toxicos sobre a economia, um antidoto que tem tido seus resultados é a tintura de belladona, junta á infusão de café

tomada em colheres de chá, e cuja dose se leva até 14 grammas (3 1/2 oitavas) em 10 horas sem que se tenha observado constricção gutturale e nem a menor dilatação da pupilla.—(*Con. medicales.*)

A embriaguez e seu tratamento.—Como, nem sempre se pode ter de prompto o ammoniaco, para obter o mesmo resultado dissolvem-se tres onças de sal marinho em um copo d'agua que se dá a beber ao doente. (*Connaissances medicales.*)

BIBLIOGRAPHIA.

Molestia syphilitica no figado, nos pulmões, nas glandulas bronchicas, na dura mater e no craneo, pelo Dr. Herrmann Weber, medico do hospital dos allemães em Londres.

Fomos obsequiado pelo Sr. Dr. Weber com um folheto contendo a reimpressão de um artigo seu que versa sobre syphilis visceral, e que foi publicado nas *Transactions of the pathological Society*. vol. XVII. 1866

Suppondo que a alteração syphilitica dos órgãos internos deve ser por varios motivos frequentissima neste paiz, como em outros, embora passe muitas vezes para nós desapercibida, julgamos util dar aos nossos leitores resumida noticia sobre o interessante artigo cujo titulo acima transcrevemos.

A historia clinica do caso relatado pelo Dr. Weber é, como elle mesmo previne, incompleta; foi observado este caso pouco tempo antes da sua terminação fatal, porem não havia duvida que o doente houvesse soffrido de syphilis, pois era isto comprovado por cicatrizes no penis, e cicatrizes symetricas na garganta; alem disso acharam-se na autopsia signaes de periostite do sternum, de inflamação dos ossos do craneo, de uma affecção especial do figado, e um engorgitamento geral das glandulas lymphaticas em todo o corpo, phenomenos pelos quaes os Drs. James Andrews e Jonathan Hutchinson, que tiveram de dar um relatorio sobre o artigo do Dr. Weber, não hesitaram em appoiar a justeza do diagnostico de syphilis n'este caso, diagnostico que só pode ser feito pela autopsia. Eis o caso:

O paciente, que era maritimo, carpinteiro de um navio mercante, de idade de 28 annos, foi atacado, em 14 de dezembro de 1865, de dores suppostas rheumaticas no quadril direito, e em ambos os joelhos, dores que ainda perduravam quando elle foi admittido no Hospital; estas articulações estavam pouco inchadas, e a febre, se se levar em conta os appa-