

região do dedo; e ou porque algumas escamas tivessem sido levantadas ou destruídas pelo atrito da escova de unhas, ou porque ella tivesse sido promptamente amollecida e embebida pela humidade quente das partes sexuaes, não tinha mais opposto obstaculo á penetração do virus. Para quem tem frequentemente praticado a vaccina, limitando-se á levantar a epiderme a não deixar nenhum traço immediato da passagem do instrumento, este facto d'inoculação septica nada tem de mysterioso. Seja como for, a inflammação se desenvolvia, e diminuto em minuto se accusava mais formidavel; ja ella projectava a dor sobre as articulações metacarpo-phalangianas dos dedos indicador e medio; e n'este começo rapido, tendo, em conta sobretudo a etiologia á qual só se podiam ligar os accidentes, eu tinha certamente a temer o desenvolvimento dos symptomas mais perigosos. Esperei todavia, reprimindo o desenvolvimento ascencional do calor organico no dedo comprometido, não somente obter a quédia da inflammação, cujo principio é este calor, mas ainda, *estabelecer, para o elemento septico, condições de temperatura pouco favoraveis á sua proliferação, até a hora em que sua funesta virtude se tivesse esgotado no mesmo ponto*; e me appressei a untar de collodio o dedo invadido, assim como duas articulações ja tocadas pela dor. O allivio que, em um momento tão approximado da explosão inflammatoria, sobrevem tão promptamente nas condições ordinarias, se fez esperar aqui duas longas horas, depois das quaes pude gozar um pouco de somno. O resultado foi, todavia, dos mais satisfactorios: por toda a parte a dor se apasiguou, por toda a parte, salvo um ponto, aquelle que eu assignalei como a séde da inoculação, e que ficava sempre muito sensível ao toque. Persistia ainda uma ligeira inchação; porem, pouco incommoda, e de nenhuma sorte inflammatoria, porque a temperatura se tinha reduzido ao gráo normal. D'esta inchação não restavam mesmo mais traços no dia seguinte pela manhan, e depois de quatro dias ainda d'isolamento, abandonei o collodio. Esta medida de confiança não foi feliz: o dedo estava apenas despojado desde algumas horas, e já a inflammação se reproduzia, e como da primeira vez, vinha me surprehender no meio do somno. Porém, nesta nova explosão, os symptomas se accentuaram muito mais do que no primeiro ataque, e reunio-se a elles o edema da mão, um traço roseo sobre a parte interna do ante-braço, ao longo dos vasos lymphaticos, emfim, um sentimento, não de dor, porém d'incommodo e entorpecimento nas articulações do punho e do cotovello. Fóra d'isto,

nada ainda de repercussão geral, o que me permittia contar com a medieação isolante para conjurar accidentes que, não ultrapassando os contornos da séde da inoculação, conservavam um caracter simplesmente local.

Somente, d'esta vez estendo a camada de collodio pela mão inteira para atacar a inflammação nas articulações metacarpo-phalangianas, emfim um estado d'incommodo e de máo estar ao longo do antebraço e até no cotovello. Todos estes phenomenos se corrigem progressivamente, porém não desaparecem senão depois d'uma semana, deixando ainda após si o ponto duro da extremidade do dedo, cuja dor á menor pressão não cessa de fixar minha vigilancia. Depois d'uma nova semana, esta especie de callo não me dava mais senão a sensação d'uma picada desagradavel, não d'uma dor real, e eu me desembarcei do enduto isolante. Era muito cedo ainda. Todavia, d'esta vez, em lugar de se reproduzir algumas horas somente depois do abandono do isolamento, os accidentes não reapareceram senão depois de tres dias, e se desenvolveram sem intensidade; como sem resistencia, porque, bastou restabelecer o enduto impermeavel para dissipal-os no mesmo dia. Podia crer que tinha se aniquilado emfim o principio septico, mas assim não aconteceu; dez dias depois do ultimo ataque que se tinha mostrado tão benigno, quando eu tinha de alguma sorte esquecido todas estas evoluções morbidas, a inflammação se renovava ainda, e obrigava-me a voltar de novo, durante um dia, ao emprego do enduto isolante. A luta tinha durado assim cinco semanas, depois das quaes não restava mais do que o pequeno callo mencionado, mas cuja pressão não era mais dolorosa. Alguns mezes foram necessarios para a desaparición definitiva d'este ultimo vestigio da provação.

Certamente, verificando um tal resultado, lamentar-se-ha não possuir um meio de moderar, sem destruil-a, a producção geral do calor; porque então se faria contra a febre o que o collodio me permittio fazer contra a inflammação, e sem duvida se dominaria assim o typho puerperal e qualquer outra pyrexia.

Assim, d'um lado, neutralisar por agentes chimicos introduzidos na circulação sanguinea o principio toxico de que se acha infectado o sangue: d'outro lado, reduzir a producção geral do calor, moderar a temperatura exagerada, em que este principio deve desenvolver sua perniciosa virtude, tal seria o tratamento que se deveria poder instituir contra a febre puerperal, tratamento logico, indicado pela etiologia da molestia, ao mesmo tempo que pelos phenomenos immediatos que denunciam sua