

re-se a uma criança de 14 annos de idade, com uma cachexia paludosa profunda, contrahida em Iguassú, onde tinha nascido e vivido até recolher-se para o Hospital da Misericordia. Notaram-se todos os symptomas da infecção miasmatica; o baço estava muito volumoso e o figado tambem; havia edema nos membros inferiores e na face; não havia ascite; as ouriñas encerravam um pouco de albumina. O doente succumbio em consequencia dos progressos da anasarca e de uma diarrhéa copiosa e frequente que resistio aos meios mais energicos. A autopsia mostrou, alem das lesões peculiares á infecção paludosa, uma degenerescencia lardacea do figado, do baço, e dos rins, alterações estas que durante a vida não tinham sido diagnosticadas.

Não tenho até hoje observado nenhum outro caso de alteração amyloide do figado. Nas minhas enfermarias do Hospital da Misericordia e da casa de Saúde de N. Sra. d'Ajuda, raro é o individuo que morre em cujo cadaver não se pratique a autopsia: sou, por conseguinte, levado a crêr que a molestia é muito rara entre nós.

EXCERPTOS DA IMPRENSA MEDICA.

CONFERENCIAS CLINICAS DE UM MEDICO QUE ACABA
COM UM MEDICO QUE COMEÇA.

Pelo Dr. de Robert de Latour.

(Traduzidas da *Tribune Médicale*.)

Duodecima conferencia.

Pyrexia dysenterica.

Meu jovem amigo.—Expondo-vos, em minha sexta conferencia, os principios geraes da pathogenia, assignalando-vos as condições organicas d'onde nascem as aptidões morbidas, tenho vos demonstrado que sempre a molestia se estende e se complica parallelamente á vida, e que quanto mais faculdades desenvolve esta, maior numero de formas reveste aquella. Tendes podido verificar assim, através das phases successivas da organisação, que os recursos pelos quaes se executam os movimentos morbidos, são exactamente os mesmós que poem em jogo todo o mechanismo dos actos normaes, e tendes assim reconhecido: 1.º que a pathologia do vegetal não vai além das alterações do fluido nutritivo, pois que a faculdade assimiladora constitúe n'este ser simples todas as condições geraes pelas quaes se exprime a existencia; 2.º que no animal de sangue frio o circulo nosologico alarga-se com as molestias que dependem do aparelho nervoso encephalico, condição material da faculdade de sentir e de mover que vem se ajuntar aqui á de assimilar; 3.º emfim, que no animal superior, o quadro nosologico se carrega com suas ultimas

cores, e que se, attingindo a mais alta perfeição, este organismo se enriquece com a faculdade de produzir calorico, de modo a manter-se em um gráo de temperatura que lhe seja proprio, elle não obtem este privilegio que deve ao aparelho nervoso ganglionar, senão a custa de aptidões morbidas das quaes a inflammiação e a febre são os resultados, dois generos de molestias ás quaes escapam naturalmente os animaes de sangue frio, assim com os vegetaes.

E, assignalando-vos este desenvolvimento simultaneo das faculdades vitaes e dos movimentos morbidos, vos tenho feito notar, com justa insistencia, que, como o primeiro vindo á organisação, o fluido nutritivo tem sob sua dependencia os outros dois elementos da vida; que elle é condição essencial de seu exercicio, e que, por consequencia, póde levar consigo a causa de molestias que lhe são proprias.

Assim, se acha logicamente deduzida e physiologicamente estabelecida a formula *holopathica* de meu eminente amigo, Marchal (de Calvi), formula que, sem desprezar, em um complexo de phenomenos morbidos, as lesões locaes, fixa mais particularmente a attenção sobre as condições geraes; das quaes estas lesões são ás mais das vezes as manifestações de alguma sorte tangiveis, e designa assim ao pratico os pontos para onde deve dirigir seus golpes.

Não professo todavia esta opinião absoluta, que todas as affecções locaes teem sua origem no estado geral do organismo, isto é, nas condições produzidas no sangue: um orgão, qualquer que seja, póde, a meus olhos, ser atacado em sua integridade, sob a acção dos modificadores exteriores, acção, cuja repercussão, transmittida, quer pelos nervos encephalicos, quer pelos nervos ganglionares, se traduz, aqui em inflammções, alli em nevroses.

Somente, é preciso reconhecê-lo, sobretudo nas molestias agudas, é mais frequentemente ás condições geraes do organismo, á composição do sangue que cabe a responsabilidade das lesões locaes.

Distinguir estas lesões locaes, que são as manifestações de molestias geraes, d'estas mesmas lesões desenvolvidas em toda a sua independencia, e por uma causa cuja acção se encerra nos limites do orgão mesmo, eis o que importa ao pratico, e eis o que obtereis, ao menos no estado agudo, pela medida da temperatura organica.

Em diversos escriptos tenho já assignalado numerosos factos clinicos, meningites, pneumonias, etc. etc., d'onde se deduz esta lei, que a febre symptomatica d'uma affecção local

se traduz por uma temperatura que não excede de mais de dois grãos a temperatura normal, isto é, 38º, 5, e no maximo, porém muito raras vezes, 39º, emquanto as febres essenciaes se podem medir por uma temperatura que vai até 4 grãos e 6 a 8 decimos d'ascensão, isto é, 41 grãos e 2 a 4 decimos, e que então, as diversas lesões locaes que surgem, não sendo senão secundarias ao principio mesmo da febre, devem ser tambem postas em um plano secundario, quando o pratico trata de combinar seus meios de ataque.

É um novo testemunho do valor pratico d'esta lei que eu desejo fornecervos hoje, desenrolando a vossos olhos alguns exemplos dysenteria, pelos quaes julgareis do curso que póde prestar o thermometro ao pratico que quer se esclarecer sobre a filiação dos phenomenos morbidos, principal elemento d'uma therapeutica feliz.

O primeiro facto que tenho a assignalar-vos diz respeito a um velho de 84 annos, ao qual prestava seus cuidados um pratico habil, tão instruido como prudente. Este velho, d'uma constituição robusta, tinha sido de repente atacado de dores abdominaes muito vivas, acompanhadas de dejecções frequentes, phenomenos cuja explosão se tinha caracterisado, não por um calefrio, mas por um resfriamento geral ao qual promptamente succedera o calor.

Estes accidentes que tinham rompido á noite, não cessaram de augmentar durante o dia, não obstante o emprego dos opiaceos em poção, assim como em clysteres, do sub-nitrato de bismutho, das cataplasmas emollientes sobre o ventre, etc. etc; e foi pelos receios manifestados pelo nosso collega que foi reclamada a minha intervenção. Havia quasi vinte horas que a dysenteria tinha começado quando eu vi o doente: então o ventre estava muito meteorisado; as dejecções sanguinolentas e viscosas acompanhavam-se de colicas muito vivas, e, diziam, elevavam-se em numero a 40. O anus tinha experimentado uma fadiga extrema; a dor alli era incessante e dava ao tenesmo um character paroxystico; porém, o que havia de mais serio na situação, é que, a intelligencia estava, senão inteiramente extincta, ao menos profundamente tocada, a palavra rara e embarçada, a prostração absoluta. Quanto á febre, ella se mostrava por uma sede ardente, um pulso a 92, uma respiração a 36; emfim uma temperatura a 40, 5. A este ultimo signal, eu não hesitei em pronunciar-me sobre a existencia d'uma pyrexia; e, formulando meu juizo d'uma maneira mais precisa, denunciei uma febre perniciosa dysenterica, diagnostico que ordenava o emprego do sulphato de qui-

nina. Para quem não conhece a applicação de principio que eu tenho deduzido de um estudo sustentado da temperatura morbida, para quem não tem experimentado por si mesmo o seu valor, para quem emfim não tem visto, com seus proprios olhos, com que maravilhosa promptidão se apagam todas estas organopathias secundarias, quando a pyrexia mesma, atacada directamente, é moderada ou se extingue, é difficil, certamente, rejeitar para a ultima classe uma lesão material sobre cujo perigo não se poderia fazer illusão. O pratico tem verificado com vezes esta lesão material em suas indagações microscopicas; pelo pensamento a vê em seu doente, receia d'ella, e apressa-se em conjurar seu desenvolvimento.

A febre é para elle um facto de alguma sorte abstracto, metaphysico, uma simples perturbação, que muito mais disposto está elle a imputar a uma phlegmasia cuja presença verifica, do que a attribuir esta phlegmasia mesma ao principio da febre, principio que elle não póde apreciar pelos sentidos. Não vos direi aqui as lutas que tive de soffrer, as discussões tempestuosas que tive de sustentar com conferentes cuja alta posição tinha decidido a escolha e sustentava o prestigio. Os altos barões da medicina querem sempre ensinar, aprender nunca.

Todavia, mais de um teve de se inclinar diante do facto, e se não obstante a prova clinica pela qual se achava sancionada a lei que eu enunciava, não cheguei todavia a vencer uma fé mentirosa á qual uma longa tradição dava toda a força, attingi ao menos, n'estas occasiões difficeis, por curas inesperadas, o fim da medicina, e assim dei que reflectir a meus contradictores sobre a insufficiencia de sua sciencia. Aqui, appresso-me a dizel-o, longe de resistir, meu distincto collega appressou-se em acolher minhas palavras d'esperança, e o sulphato de quinina foi immediatamente administrado em solução no café, na dóse de 50 centigrammas, e por fracções de 10 centigrammas de hora em hora, de modo a poupar a irritabilidade dos orgãos inflammados. Os efeitos do poderoso febrifugo não se fizeram esperar; desde a noite, o doente, recuperando a palavra com o sentimento da existencia, reassumia seu interesse habitual por tudo quanto se passava em torno de si. Um paroxismo que appareceu ainda á noite, ja se tinha acalmado de manhan; e em nossa nova reunião tivemos a felicidade de verificar uma redução muito sensivel de todos os symptomas: a temperatura, que fornecia aqui o character ao qual eu dava mais valor, tinha perdido 1 grão e 5 decimos, a frequencia do pulso e da respiração tinham soffrido uma diminuição proporcional, e os

phenomenos locais, aquelles que dependiam directamente da lesão abdominal, tinham diminuido na mesma medida. Quanto á intelligencia, a volta era completa.

Nada havia a mudar n'um tratamento cujas vantagens se revelavam d'um modo tão prompto e tão notavel; somente, para extinguir a inflammção abdominal, que entretinha o meteorismo, e produzia colicas muito vivas, aconselhei uma camada de collodio sobre o ventre.

O effeito foi decisivo: no dia seguinte as entranhas estavam pacificadas; as dejecções, simplesmente viscosas, tinham cessado de ser sanguinolentas, e o numero d'ellas tinha se reduzido a tres ou quatro para se abaixar no dia seguinte á medida normal. Assim parecia curado o nosso doente, e a medicação quinica foi supprimida.

Era appressar-se muito; sobreveio um accesso de febre duas noites consecutivas, assignalado pelo resfriamento das extremidades dos membros e successivamente pelo calor e pela transpiração, porém sem accidente organopathico, sem manifestação local. Se tivesse necessidade de um accrescimento de demonstração para confirmar o diagnostico sobre o qual tinha sido regulado o tratamento, estes accesos de febre teriam sido mais do que sufficientes para m'o fornecerem. Não foi preciso mais do que voltar, durante tres dias ainda, á administração do sulphato de quinina, e a cura d'esta vez foi irrevogavel. Somente se tinha produzido um episodio morbido ligado á inflammção intestinal, que suscitava as impaciencias do nosso doente e o retinha no leito: do recto, onde se tinha accentuado fortemente, a inflammção tinha atravessado o anus, e tinha se propagado a toda a extensão das nadeugas, tomando as apparencias da erysipéla.

Este accidente que poderia adquirir uma certa gravidade, cuja extensão teriamos receiado, e que nos teria de certo aterrado, se nos tivesse surpreendido desarmados, este accidente perdia aos nossos olhos todo o valor, porque possuíamos para domal-o uma medicação sobre a qual não ha mais que descobrir. O collodio foi applicado sobre toda a região inflammada, observando algumas precauções de detalhe que vós devo fazer conhecer. Na margem do anus, nos ischions, e ainda sobre outros pontos, a inflammção tinha feito levantar pequenas pustulas, cuja excoiação deixava a derme sem defeza; e não só o collodio não teria adherido a estas partes humidas, mas ainda a applicação directa, sem intermediario, teria sido muito dolorosa, duplo escolho pratico a evitar. A pellicula de tripa gommada levanta felizmente a difficuldade substituindo

a epiderme, e foi depois de termos revestido com ella todos os pontos comprometidos, que recorremos aq collodio para completar o isolamento. Não esqueçamos dizer que a pellicula de tripa no momento de ser posta em uso não deve ser molhada; que é a derme mesma que se deve humedecer ligeiramente para applicar-lhe a pellicula. Esta membrana é tão delgada que se inutilisa por pouco humida que esteja, e rouba-se assim ás necessidades do curativo. Bem ou mal empregado, um bom processo therapeutico é bem ou mal succedido, e muitas vezes é por terem sido falseadas por mãos inhabeis que as mais poderosas praticas incorrem n'um longo discredito. Este curativo pela pellicula de tripa gommada, duplicada de collodio, é maravilhoso contra a queimadura, quando o tecido cutaneo se acha despojado de sua epiderme. O resultado foi completo aqui, e nosso doente se restabelecco então sem outro incidente.

Depois da velhice, a infancia: estas duas epochas da vida são as que oppoem ás molestias menos resistencia. Todavia, as leis que regem o mecanismo vital são sempre as mesmas: e se a idade, ás vezes, impõe ao medico a necessidade de modificar seus meios de acção, a medicina, na realidade, do começo ao fim da existencia, mantém seus principios fundamentaes. A creança, de 2 annos d'idade, que foi atacada de *dysentaria pyretica*, e acerca da qual desejo occupar vossa attenção, apresentou os mesmos phenomenos que o nosso velho; n'ella a parte do cerebro na molestia, traduzio-se da mesma sorte pelo entorpecimento, ao qual todavia juntavam-se alguns movimentos convulsivos; n'elle tambem foi o thermometro que, elevando-se a 40°, 5, me descobrio o caracter secundario das manifestações inflammatorias, desembaraçou meu diagnostico de toda a incerteza, e permittio-me assim affirmar a existencia d'uma febre perniciosa.

N'elle ainda o sulphato de quinina conjurou logo os accidentes cerebraes, para attingir mais tarde as entranhas; e emfim, ultimo traço de semelhança, dois paroxismos febris romperam na creança como no velho, depois da cessação prematura da medicação febrifuga, e impuzeram, n'um como no outro, a obrigação de voltar ao tratamento para ter definitivamente a razão da molestia. A unica differença a notar foi que, em nosso velho, a administração do sulphato de quinina pela via do estomago foi das mais faceis, enquanto em nosso menino, foi preciso recorrer á absorpção cutanea. Foi empregada, em fricções, todos os dias, nas côxas, nas verilhas, nas curvas das pernas, nos braços, etc., uma pomada carregada de sulphato

to de quinina, na proporção de 2 grammas para 4 grammas de banha; e este recurso foi sufficiente. Feliz recurso! porque, além de que o meu pequeno doente era preza de vomitos, phenomeno pouco compativel com a ingestão no estomago d'um medicamento activo, repellia obstinadamente qualquer outra bebida a não ser agua fresca; e, quanto ao intestino, a frequencia das dejecções e o tenesmo exprimiam sufficientemente que não era d'este lado que deviamos achar alguma facilidade de administração.

O emprego do sulphato de quinina pela pelle me tem prestado, sobretudo nas creanças, brilhantes serviços; porém devo declarar-o, um tal processo therapeutico fica sem valor, se não é objecto d'uma applicação intelligente. Os meninos devem ser friccioneados, não por meio de um tecido, de flanela ou outro qualquer, no qual se perderia a pomada, porém, com a mão nua, e a operação deve se prolongar até a dissecação da região em que se pratica. Aconteceu-me, quando o perigo era imminente, empregar até 10 grammas d'este sal nas 24 horas. Ignoro quanto era absorvido; mas, o que posso afirmar é que admiraveis resultados tem, em vezes em minhas mãos coroado esta pratica. Esta dóse consideravel de 10 grammas foi posta em uso, tres dias consecutivos, em uma menina de 2 annos, para a qual um dos nossos mais estimaveis e sabios collegas, o Dr. Roger, tinha sido chamado em conferencia. Eis a razão que nos instava assim a fazer absorver, em pouco tempo, uma grande quantidade de sulphato de quinina: convalescente d'um sarampão que nada tinha tido de grave, esta creança foi de repente atacada d'uma febre cuja intensidade se media por 41.º com o thermometro collocado na cavidade axillar, e a esta febre juntou-se uma pneumônia esquerda da parte posterior do vertice, pneumonia sobre cuja existencia não deixavam nenhuma duvida, nem a percussão que dava um som obscuro, nem a escutação que fornecia um sopro misturado de fervores crepitantes.

Armado de observações pessoaes que lhe tinham revelado a coincidência da pneumonia com uma temperatura de 40 e 41 grãos, affeccionado de longa data ao cultô da anatomia pathologica, por um paciente labor de amphitheatro, o Dr. Roger se achava irresistivelmente arrastado a não conceder a este calor febril senão um valor secundario, para concentrar sobre a phlegmasia local toda a sua attenção e todos os seus esforços. Tal não era a minha opinião. Porém, captivado pela vasta experiencia que possúe nosso eminente collega das molestias da infancia, experiencia que ninguem lhe con-

testará, feliz em dar-lhe um testemunho de deferencia, nutrindo o pensamento de que teriamos ainda tempo de conjurar a pyrexia, que, a meus olhos, era a molestia principal, se a medicação dirigida contra a lesão local ficasse infructifera, fiz violencia a minha convicção, e associei-me a um plano therapeutico que não era o meu, e no qual figuravam, em primeira linha, o emprego do kermes mineral e a applicação d'um vesicatorio sobre a região escapular esquerda. Não tinha contado com as surpresas da febre perniciososa; e, por addiar a unica medicação que seria opportuna aqui, eu não fazia addiar as desordens da molestia. Rompeo á noite um paroxysmo no qual tomaram parte o cerebro e os orgãos digestivos, e pela manhã em nossa nova reunião a infeliz creança estava em uma situação extrema: vomitos e diarrhéa, modorra e convulsões, eis o quadro que ferio nossas vistas; e, penetrando nos detalhes d'este deploravel estado, tivemos a verificar uma larga dilatação das pupillas, um pulso precipitado ou enfraquecido, e sempre irregular, uma temperatura que, ora se abaxava para elevar-se, ora se elevava para abaxar-se; ter-se-bia dito uma tuberculisação cerebral se não fosse a marcha rapida e como fulminante dos accidentes. Nem mais um minuto a perder n'este perigo urgente; e se fosse possivel reter ainda á vida esta innocente creatura, não podia ser senão com a condição de fazer absorver em muito pouco tempo mui altas doses de quinina. A creança foi salva. Esta contraprova de meu diagnostico valia bem uma prova necroscopica.

Em meu pequeno doente atacado da pyrexia dysenterica, não empreguei senão duas grammas de sulphato de quinina por dia; e si, não obstante a queda da febre que seguio de perto as fricções, pudesse-se levantar uma duvida sobre a absorção do sal febrifugo pela pelle, esta duvida se desvaneceria infallivelmente sob a pressão de uma contra-prova que estavamos longe de procurar.

Nos dois primeiros dias, quando a creança, muito abatida, não oppunha nenhuma resistencia ás fricções que se podia assim prolongar 12 a 15 minutos, o allivio foi prompto, e de continua que parecia a principio, a affecção se mostrou em seu verdadeiro character, isto é, remittente, n'este ponto que a temperatura organica elevada durante a noite a 40 e 41º, descia no dia até 38º, que o pulso cahia de 156 a 116, os vomitos se apasiguavam, as dejecções se espaçavam, e os accidentes cerebraes se desvaneciam emfim. Porém, tornado intolerante e difficil sob o imperio mesmo d'este bem estar, a creança não respondia mais senão pela agi-

tação e pela colera ao cuidado que tinha sua mãe em friccional-a; e esta, commovida por seus gritos, reduzia a duração da operação para reduzir a duração de suas lagrimas. Esta fraqueza teve seu castigo: temperatura, pulsações arteriaes, accidentes cerebraes, symptomas abdominaes, o complexo de todos os phenomenos morbidos se reproduzio com a mesma intensidade, a mesma continuidade que no começo, e foi preciso voltar a uma pratica mais séria das fricções. Quatro dias d'esta medicação bem empregada bastaram para o restabelecimento definitivo.

Nada mais instructivo, certamente, do que a comparação de factos pathologicos cuja identidade se affirma pelo complexo dos symptomas, e cujo desenlace, mais ou menos prompto, mais ou menos feliz, sanciona ou infirma os principios de que se inspirou o pratico em suas operações therapeuticas. Os exemplos de dysenteria, com os quaes acabo de entreter-vos, os tenho considerado como verdadeiras pyrexias, cujo echo repercutia vivamente no cerebro e no intestino: não vi n'elles outra coisa senão uma *febre essencial remittente*, cujo character se disfarçava pela continuidade dos accidentes morbidos, d'um lado, por manifestações locais do outro; e foi sobre a cifra da temperatura animal que eu formulei este diagnostico etiologico. D'uma tal apreciação se deduzia directamente a indicação dos anti-periodicos, e vistas pelos resultados clinicos se este juizo era fundado. Levemos agora nossas vistas a um outro exemplo de dysenteria, cujo aparelho symptomatico foi semelhante, salvo todavia a gravidade, que foi muito menor; salvo ainda a repercussão do cerebro que faltou aqui completamente; e, vejamos que resultados se cumpriram sob uma therapeutica que, estranha ao dogma da generalisação morbida, tomou todos os seus elementos ao principio organopathico. O objecto d'esta observação é uma senhora, de 68 annos d'edade, d'uma bella e rica organisação, conservada como se não é n'esta idade, e que recebo os cuidados de um dos nossos collegas mais illustrados do departamento de Seine-et-Oise. A dysenteria se apresentava aqui com seus caracteres ordinarios: dores abdominaes muito vivas, borborygmos incessantes, meteorismo muito desenhado, dejecções frequentes, viscosas, sanguinolentas, tenesmo doloroso, nauseas fatigantes: eis os symptomas locais.

Quanto ao estado geral, se assignalava pela frequencia do pulso, elevada a 112 e 120, pela cephalalgia, quebramento dos membros, por um redobramento febril, que, rompendo á tarde, entretinha toda a noite uma cruel insom-

nia; emfim por um calor ardente, não medido ao thermometro, mas que impressionava vivamente o pratico a quem era incumbida a direcção do tratamento.

Concentrando toda a sua attenção sobre a phlegmasia intestinal, á qual elle attribuia a febre, assim como todos os phenomenos abdominaes, nosso collega instituiu um plano de ataque, que tinha por base o sub-nitrato de bismutho e o opio, e por auxiliares as bebidas feculentas, os clysteres amylaceos, as cataplasmas emollientes sobre o ventre e a abstinencia mais rigorosa. Van foi esta therapeutica durante cinco dias; e a familia, atterrada d'esta resistencia inesperada, impaciente por collocar a doente sob a mão de que ella tinha longo habito, chamou-me, por um telegramma, quando eu estava longe de Paris. Havia oito dias que a doente se achava de cama quando cheguei junto a ella, e felizmente então um pouco de allivio se tinha produzido em sua posição: as dejecções tinham sensivelmente diminuido de frequencia, e todos os symptomas locais se tinham parallelamente reduzido; a febre se accusava ainda, á noite, com um certo ardor, porem descia, durante o dia, a um gráo baixo; indicio notavel do character pyretico remittente da molestia, mas cujo sentido o nosso collega, sob a pressão das ideias absolutas da localisação, deixava escapar. E todavia, elle conhecia a causa exterior sob cuja acção tinha se manifestado esta dysenteria febril; sabia que todo o seu principio estava nos miasmas deletorios que tinha respirado a doente, vigiando, com uma attenção sustentada, trabalhos de limpeza, que fazia executar em um vasto tanque na extremidade de sua propriedade. Seja como for, o mal estava em diminuição, e teria sido inopportuno pôr em questão, quer a natureza da molestia, quer o valor do tratamento observado. O doente não tinha a tirar nenhuma vantagem de semelhante discussão. Approvando, pois, tudo quanto tinha sido feito afim de fortificar sua confiança e augmentar a tranquillidade, contentei-me em deplorar em silencio estes systemas estreitos de pathologia, em que ha sempre lugar para os efeitos, e nunca para as causas.

Certamente, a affecção aqui era muito menos perigosa, do que tinha sido no meu velho de 84 annos; havia cephalalgia, mas sem delirio, sem coma, sem mesmo enfraquecimento dos sentidos; cansaço e debilidade, mas sem prostração; e todavia esta senhora restabeleceu-se com difficuldade; a custo curada em tres semanas, somente depois de ainda mais de um mez de convalescença é que recuperou suas forças. No meu velho, pelo contrario, todo o

perigo foi conjurado em menos de 24 horas, sob a acção do sulphato de quinina, e a não ser esta inflamação crisyelatosá, que, da margem do anus se tinha propagado a toda a região circumvisinha, teria podido abandonar a cama desde o sexto dia. Somente se levantou no decimo; mas então não era simplesmente a cura; era o restabelecimento, isto é, a reparação que era completa.

Ignoro se todas as febre dysentericas, as que se assignalam por uma temperatura de 40 e 41º, devem ser classificadas indistinctamente, e confundidas entre as febres perniciosas, de modo que se tornem todas tributarias da medicação anti-periodica. O que ha de certo, é que onde grassam as febres intermittentes, lavra tambem a dysenteria: communitade d'etiologia que parece indicar uma communitade de natureza.

Por mim, nunca hesitarei, mesmo fóra d'estes focos perniciosos, d'onde se exhala constantemente a febre, em pôr em uso o sulphato de quinina contra toda a dysenteria, que, pela indicação thermometrica, se mostrar ligada a uma febre essencial, a menos todavia que esta febre se separe evidentemente das febres remittentes, por indicios especiaes que fixem seu character, taes como os que denunciam as febres eruptivas, a febre typhoide, etc., etc.

Porém, as dysenterias não dependem todas d'um principio febrigeno; tôdas não são pyreticas, e encontrareis em vossa pratica mais de uma com um character simplesmente local. Aqui as dejecções se succederão igualmente com frequencia; serão da mesma sorte viscosas e sanguinolentas; tambem se acompanharão de colicas mais ou menos vivas, até de vomitos e de um doloroso tenesmo; a cephalagia, o cansaço, a precipitação do pulso, em uma palavra, o complexo dos phenomenos pelos quaes se annuncia a febre, se ajuntarão ainda a todos os symptomas da inflamação intestinal; porém, elles se manterão em fracas proporções, e interrogando a temperatura do corpo, que achareis a 38º ou 38º5, medida da febre symptomatica das inflamações locais, reconheceréis que ha nellas um ponto capital, pelo qual se distinguem das molestias, que tendo o mesmo nome, devem se separar no tratamento. Tentlo, ha alguns mezes, prestado cuidados a uma senhora d'uns cincoenta annos, que se achava na situação que acabo de traçar, empreguei a titulo de ensaio, mas sem grande esperanza, o sulphato de quinina que se mostrou em minhas mãos tão poderoso contra a dysenteria pyretica, e esta tentativa foi completamente infructifera. Minha doente deve sua cura á administração da ipecacuanha,

genero de tratamento que, posto em honra, ha dois seculos, pelo medico hollandez Helvetius, teria sem interrupção mantido seu favor se não tivesse sido o poderoso promotor do physiologismo, que não cessava de mostrar aos praticos aterrados os orgãos digestivos sempre promptos a protestar, por um grito de soffrimento, contra o contacto dos agentes mais inoffensivos, e cuja virtude, therapeutica tinha cem e cem vezes recebido a consagração clinica.

Este tratamento pela ipecacuanha é d'uma efficacia incontestavel contra as phlegmasias intestinaes, e eu teria recorrido a elle sem hesitação, para meus dous primeiros doentes, assim como para a ultima, se n'um a pacificação das entranhas não tivesse seguido de perto a declinação da febre, e si no outro uma camada de colloidio sobre o ventre não tivesse scito immediatamente justiça á inflamação local que sobrevivia á pyrexia. Seja como for, reconheceis n'estes factos diversos que a distincção das dysenterias entre si não é somente uma questão de medida, mas que a etiologia cava aqui um sulco profundo para separar da dysenteria local aquella que é ligada a um elemento pyretico, e que a temperatura organica se destaca do complexo dos symptomas para vos denunciar o segredo d'esta etiologia, sobre a qual se deve regular o tratamento.

NOTICIARIO.

Administração de alimentos e de remedios pelo nariz. — O Dr. Moxey recommenda na *Lancet* que em certos casos, e especialmente nos de alienação, se aproveite o nariz para administrar os alimentos ou os remedios, que os doentes pelo seu estado mental ou por impossibilidade physica não podem receber pela bocca. Conservado o doente immovel, com auxilio de 2 ou 3 ajudantes, que mantêm a cabeça bem firme, e a ponta da barba ligeiramente elevada, eis aqui como procede o Dr. Moxey: Introduz a extremidade d'um pequeno funil de Wedgwood, mas lentamente, em uma das narinas, e depois vae lançando na parte evasada o liquido que quer administrar, porém pouco a pouco, parando de quando em quando, para permittir que o doente faça inspirações completas, e evitar a accumulção do liquido no funil. Alguns doentes, apesar do acto reflexo da deglutição que encaminha o liquido apenas toca na pharynge, deixam sahir com impetuosidade algumas gotas de liquido pela bocca. Mas n'este caso o Dr. Moxey deita o liquido mais depressa no funil, por modo a deixa-lo accumular, e a despertar uma serie continuada dos actos da deglutição. Em algumas circumstancias difficeis tambem tem achado necessario comprimir a narina opposta, de sorte a obstar toda a respiração por ella. A sua opinião é que em nenhum caso deixa o medico de poder administrar ao doente uma qualquer bebida, mas que só elle pôde apreciar devidamente até que ponto é preciso interromper a respiração nasal, e qual o numero de actos de deglutição que pôde promover. (*Escholiaste Medico.*)