

inutil para as concreções situadas abaixo da superfície do canal, as únicas cujo diagnostico offerece verdadeiramente grandes difficuldades.

Quanto á therapeutica que se deve instituir contra esta affecção; é praticar a talha prostática, unica operação racional, pois que ella permite extrahir as concreções e ao mesmo tempo dar sahida ás colleções purulentas, que existem.

RESENHA THERAPEUTICA.

A etherisação local nos vomitos incoerciveis. O Sr. Barillier refere na *Union med de la Gironde* um caso de vomitos incoerciveis n'um individuo affectado de dyspepsia flatulenta, que somente foram dominados pela pulverisação do ether no epigastrio por meio do aparelho de Richardson.

A belladonna, o bismutho, o chloroformio, o gèlo interna e externamente, e um vesicatorio na região epigastrica não conseguiram acalmar os vomitos biliosos, nem corrigir a constipação obstinada que affligia o doente. O Sr. Barillier recorre então á etherisação local, e durante quatro dias, trez vezes por dia, anesthesiou largamente a região do estomago, ao mesmo tempo que o doente tomava o gèlo internamente, e com isto os vomitos diminuíram logo de frequencia e cessaram no quarto dia.

Emprego hypodermico do centeio contra as hemorragias post-partum. Do *Medical Record* transcreve a *Tribune Medicale* o caso seguinte do Dr. Lente:

A Sr.^a E. D. deu á luz depois de um trabalho natural. Quasi immediatamente depois da extracção facil da placenta, produzio-se uma hemorragia abundante; em muito pouco tempo, pallidez extrema, pulso quasi insensivel, estado syncopal grave. Fricções do utero; excitação do collo; extracto de centeio de Squibb, meia oitava; gèlo na vagina; compressão parcial da aorta. O utero se contrahio primeiro, depois tornou-se de novo inerte. Então o doutor Lente injectou debaixo da pelle vinte e cinco gotas da solução de centeio. Em quatro ou cinco minutos houve já uma contracção mais tonica do utero; mas, no fim de treze minutos, ficando o orgão inerte, o auctor injectou cerca de 35 gotas da mesma solução. Nenhum outro effeito notavel se produzio senão a ausencia de nova hemorragia.

Em um caso semelhante, o Sr. Lente injectaria meia oitava, e repetiria a injectão tantas vezes quantas fossem necessarias, até o effeito completo.

Um antidoto simples do cynureto de potassio.

O Dr. Steams refere um caso bem interessante de envenenamento pelo cyanureto de potassio, em que em falta de outro meio, tendo somente á mão wiskei ou aguardente, encheu com ella o estomago por meio da bomba, com o fim de excitar o coração e provocar a eliminação rapida do veneno, e assim o envenenado curou-se.

O opio como antidoto da belladonna. O Dr. Macker refere na *Soc. med. du Haut-Rhin* uma observação feita em um menino de 12 annos que engolio de uma vez vinte pilulas de uma centigramma de belladonna que se lhe tinha prescripto contra a incontinenca d'urinas. O menino apresentou os symptomas d'envenenamento; delirio alegre e loquaz, physionomia muito movel; apyrexia, dilatação das pupillas. O Dr. Macker prescreveo-lhe uma poção com 18 gotas de laudano. O delirio continuou durante todo o dia; urinas e dejecções involuntarias; noite agitada. No dia seguinte pela manhã, mais delirio; pulso a 92. A mesma poção. No dia seguinte intelligencia clara; pupillas normaes. No quarto dia o menino voltou para a escola.

Tratamento da preumonia pela ipccacuanha em alta dose. No *Journal de med. et chir. pratiques*, o Dr. Chauffard preconisa este tratamento feito do seguinte modo: emprega a ipecacuanha em infusão feita com 5 a 8 grammas de pó da raiz, em 200 grammas d'agua fervendo, para ser tomada depois de fria, ás colheres de sopa, de hora em hora.

Esta medicação produz em um doente muitos vomitos, em outros dejecções intestinaes, e em outros ambas as coisas. O remedio não produz effeito quando é inteiramente tolerado. No 2.^o dia prosegue-se no mesmo tratamento, e no 3.^o e seguintes vai-se diminuindo de 1 a 2 grammas a quantidade da ipecacuanha, devendo suspender-se logo que o pulso mostre remissão e a temperatura tenha chegado ao nivel physiologico.

Na pneumonia ataxica o Dr. Chauffard recomenda o almiscar em alta dóse, nesta formula: Julepo gommoso, 425 grammas; Almiscar em pó, 2 grammas; Tinctura alcoolica d'almiscar, 50 gotas. Mandê e dê 1 colher de sopa de 2 em 2 horas.

O chloral e suas virtudes therapeuticas. O descobrimento d'este novo medicamento tem arrastado os entusiastas da novidade a experimentarem sua efficacia therapeutica em diferentes molestias e nas mais variadas circumstancias. Centenares d'ensaios clinicos tem apparecido no jornalismo medico, e muitos d'elles mostrando ás vezes resultados contradictorios.