

afim de que d'est'arte aprecie o modo por que procedi em um assumpto de tanta gravidade, o qual, em verdade, deve de attrahir e reclamar os mais serios cuidados da parte d'aquelles, á cuja guarda estão os interesses mais subidos e vitaes e o bem estar da população.

As localidades do interior da Provincia, onde em mais larga escala desenvolveram-se febres palustres, diarrhéa e dysenteria forão as villas de Alagoinhas, Inhambupe e Camisão. Para esses lugares o Governo fez partir Facultativos, com ambulancias sortidas dos necessarios medicamentos, afim de que a população desvalida ali residente não experimentasse falta d'aquelles soccorros, que mais urgentes se tornassem.

Desejava em meos relatorios annuaes ministrar a V. Ex. informações circumstanciadas acerca das condições sanitarias das localidades do centro da Provincia, mas é-me isto impossivel, porque faltam-me absolutamente documentos e observações, colligidas por pessoas profissionaes, onde a respeito encontre alguma luz.

É certo que para aquellas localidades, onde manifestão-se molestias epidemicas de alguma gravidade, costuma o Governo, logo que d'isso tem conhecimento, enviar os soccorros, que são de mister.

Infelizmente, porem, os Facultativos, encarregados d'essas commissões, de ordinario, dão muito resumida conta de seos trabalhos, de sorte que não se pode formar um juizo baseado acerca da etiologia, natureza, marcha, e de todas as outras circumstancias concernentes ás individualidades morbidas, que em taes pontos se tenhão desenvolvido.

A organização d'um serviço medico rural, conforme tenho feito vêr em meos relatorios anteriores, Lãõ só encheria similhante lacuna, como seria uma providencia, que traria immensos resultados, em pról do bem estar d'essas populações, que tão isoladas e esquecidas vivem.

É este objecto digno da maior attenção, por qualquer lado que se o encare, e se por ventura podessemos obter regularmente esclarecimentos e dados convincentes teriamos preciosos e fecundos materiaes, que bastante interessariam á pathologia, á statistica medica, e á hygiene.

Referindo-me quanto ao mais ao que ja tenho exposto em outras occasiões, concluirei o presente, e mal elaborado trabalho, disendo—que a sociedade á medida que aperfeiçoa-se—mais rasão tem para considerar e zelar a vida de qualquer individuo, seja qual for a classe á que elle pertença; pois que em verdade, este é o traço realmente bello e grandioso, e o caracter especial da civilização.

Deus Guarde a V. Ex.—Bahia e Inspectoria da Saude Publica em 8 de Fevereiro de 1871—Illm.º e Exm.º Sr. Dr. José Pereira Rego, D. Presidente da Junta Central de Hygiene Publica—*Dr. José de Goes Siqueira, Inspector da Saude Publica.*

CORRESPONDENCIA SCIENTIFICA

APONTAMENTO SOBRE UMA MOLESTIA REINANTE EM PERNAMBUCO.

Recife 9 de Junho de 1871.

Illms. Snrs. Redactores.—Reinando n'esta cidade uma molestia inteiramente desconhecida, no quadro pathologico, e convieto da dedicação que nutrem Vv. Ss. pela sciencia, peço venia para enyiar-lhes um pequeno esbôço, a fim de que se dignem de dar-lhe publicidade se julgarem que merece tão subida honra.

Ha mais de anno que se apresentam em di-

versos pontos d'esta cidade casos isolados de uma molestia desconhecida, e actualmente na casa de detenção sob a forma epidemica, accommettendo grande numero de detidos em poucos dias.

Esta molestia, em sua symptomatologia e mais caracteres pathologicos, tem zombado de todos os meios empregados, e continúa a fazer victimas em crescido numero de accommettidos, sem que possamos classifical-a convenientemente.

Assemelhando-se essa affecção ao que ahi se denomina Beriberi, segundo os importantes trabalhos do nosso distincto collega, o Snr. Dr. Silva Lima, com tudo não apresenta symptomatologia identica.

A pathogenesia, marcha rapida, e o numero de victimas, em relação aos accommettidos, nos fazem consideral-a como uma das mais graves molestias até hoje observadas. Entre 48 pessoas accommettidas na casa de detenção, em poucos dias, fallecerão 14, e, a não ser a humanitaria medida de removel-as para o Presidio de Fernando, parece-nos que não escaparia uma só, á vista do desanimo que reinava entre ellas, e da falta de efficacia da medicação empregada. O desenvolvimento d'essa affecção é, a mór parte das vezes, repentino e sem prodromos, accommettendo as pessoas nas melhores condições de saúde. Outras vezes, porém, os accommettidos sentem antes ligeiras edemacias nas extremidades pelvianas.

O edema apresentando-se nos maléolos sobe rapidamente ao abdomen, thorax e face, apresentando o doente o caracter de uma pessoa affeita ao uso das bebidas alcoolicas; sendo isto algumas vezes acompanhado de febre, com o typo intermittente e outras vezes sem ella. Aparecem vomitos mucosos e biliosos.

Os musculos abdominaes tomão tal rigidez, que não permitem, a mór parte das vezes, o exame das visceras. As pernas apresentam um estado de paralysisa que impossibilita os doentes de manterem-se em pé, exagerando-se entretanto a sensibilidade da pelle e dos musculos, a ponto de darem gritos pela menor pressão que soffrem.

Tive um doente que não supportava nem mesmo o contacto dos cobertores sobre as pernas. A paralysisa vai, algumas vezes, estendendo-se aos membros thoracicos, até inutilisar o uso das mãos. A marcha da inchação é tão rapida, que, algumas vezes em 24 a 48 horas, tem chegado ao seu auge, e n'este estado manifesta-se a constrictão da base do thorax, a que os doentes denominão travessão. He deploravel o estado do doente n'esta condição; os seus traços tornão-se disformes: os padecimentos

extremos, e por cumulo de seus soffrimentos ficão intactas as faculdades intellectuaes. A ourina é regular e não apresenta albumina. O ventre, a mór parte das veses, é constipado; em outras pórem existe diarrhea. A dyspnéa augmenta-se com a marcha da infiltração, seguindo-se orthopnéa acompanhada; no maior numero dos casos, de tosse suffocante com expectoração de catarrho verde acompanhado de estrias sanguinolentas. A anorexia é grande d'esde o começo da molestia, e a sede não responde a infiltração. Os doentes accusão ligeiros formigamentos na direcção dos plexos nervosos, e quando apparecem ligeiras convulsões expirão ou em consequencia da asphyxia, ou no estado comatoso.

A anatomia pathologica não explica a causa de tão grandes e variados soffrimentos; pois os principaes órgãos não apresentam alteração alguma morbida, e só as mucosas mostram-se hyperemiadas: ha derramamentos sorosos nas cavidades, e o tecido cellular apresenta uma consideravel espessura em consequencia da infiltração sorosa

Em alguns cadaveres se tem notado engorgitamentos sanguineos em um dos pulmões, talvez devido a terminação da molestia.

A etiologia d'esta molestia é de todo desconhecida, pois que, notando-se anteriormente casos disseminados em diversos pontos da cidade, não podemos attribuir ás causas inherentes a casa de detenção, por so ter ahi actuado, quando muitos casos ja tinham sido observados, em pontos longiquos, e nas melhores condições hygienicas d'esta cidade. Pelo que só podemos considerar, que a vida sedentaria e mais condições proprias d'essas casas, são predisponentes e dão incremento á causa que está actuando entre nós.

Somos antes de parecer que o germen d'esta molestia proceda das escavações, a que está sujeita esta cidade, depois que para os encanamentos foram abertos valados atravez de depositos de ossadas humanas, ou antigos cemiterios, que existião em diversas partes.

O tratamento até hoje empregado tem sido o mais variado possível, procurando-se pelos meios mais racionaes combater os symptomas que vão aparecendo.

O uso da digitalis, scilla, ipecacuanha, calomelanos, estimulantes drásticos, noz vomica e tudo quanto é aconselhado para combater as hydropisias e paralyrias, tem sido empregado sem exito algum.

O empirismo tem desempenhado um importante papel n'esta quadra, sem que d'elle se tenha podido obter resultado algum satisfactorio.

Aguardamos o resultado da viagem, para

vermos, se será o único paradeiro aos progressos de tão caprichosa molestia. São estas as observações que tenho podido colher dos doentes que tenho tratado, e das informações fornecidas pelo nosso distincto collega o Snr. Dr. Seve, medico da enfermaria da casa de detenção e de alguns outros collegas, que de boa vontade se tem prestado a fornecerem-me o resultado de suas observações.

O governo da provincia nomeou uma comissão de sete collegas, para estudarem a molestia, a qual ainda não pôde dar o parecer decisivo sobre a sua natureza e mais condições, o que aguardamos para scientifical-os a respeito.

Dr. Ignacio Alcibiades Velloso.

VARIEDADE

CHRONICA.

Necrologio:—A Sciencia medica acaba de soffrer tres grandes perdas. Desapparecerão d'entre os vivos tres grandes vultos: Niemeyer, Longet e Payen.

O sabio author do *Tratado de pathologia interna e therapeutica*, o profundo observador, o eminente clinico, Felix von Niemeyer morreu em 14 de março deste anno, em Tubingue, de uma febre typhica, adquerida nos hospitaes de Lorena, na ultima guerra, onde serviu no corpo de saude.

Era filho do distincto medico Dr. Carlos Niemeyer, de Magdenburgo, onde nascera em 31 de Dezembro de 1820.

Estudou medicina em Halle em 1837.

Estabeleceu-se em Magdeburgo em 1844, onde foi nomeado em 1853 director da secção medica do Hospital.

Em 1855 foi nomeado para a cadeira de Pathologia interna e therapeutica, e tambem director de clinica medica do Asylo provincial de alienados.

Mais tarde (em 1860) foi convidado para Tubingue, onde continuou o magisterio: em 1865 foi nomeado medico do Rei do Wurtemberg.

Com a sua monumental obra de pathologia deu este sabio nova face a sciencia do diagnostico pelas pesquisas e observações interessantes com que enriqueceu este ramo tão importante da medecina, e pela therapeutica sabia e prudente, sem apparatus de formulas complicadas ou banaes, mas sim de medicamentos reconhecidos e sancionados pela experiencia.

O illustre physiologista Longet, morreu em Bordeaux. Este homem notavel, era professor na Faculdade de Medicina de Paris, membro da Academia de medicina e da Academia das