

*Recapitulação.*—Existiam 272; entraram 56; falleceram 46.

Mortalidade geral—14,02 por 100.

Mortalidade nos menores de 1 anno 37,03 por 100.

*Molestias de que falleceram:*

Fraquesa congenita.....	8
Sarnas.....	6
Tetanos.....	6
Escrophulas.....	4
Dentição.....	3
Dysenteria.....	3
Febre typhoidea.....	3
Febre perniciosa.....	2
Convulsões.....	2
Angina.....	2
Anasarca.....	2
Variola confluenta.....	2
Vermes intestinaes.....	1
Colite.....	1
Abscesso na caixa thoracica.....	1

—  
46

Além destas enfermidades predominaram outras, sem que produzissem resultados funestos; taes como dertos, bronchites, laryngites, febres intermittentes, diarrhéa, ophthalmia etc.—Dr. Antonio Mariano do Bomfim.

NOTA Á CERCA DE UM CASO DE NEVROSE ESPASMODICA, SEGUIDA ÀS VEZES DE HEMOPTISIS, E MUITO IDENTICA Á MOLESTIA QUE NA INGLATERRA SE DENOMINA ASTHMA DO FENO OU FEBRE DO FENO (HAY-FEVER).

Pelo Dr. Julio Rodrigues de Moura

(Conclusão)

O que vem a ser a asthma do feno?

A asthma do feno ou febre do feno é uma molestia muito commum na Inglaterra e na Allemanha, e que tambem tem sido observada com menos frequencia na França e em outros paizes. Parece que ella reina em certa e determinada epocha do anno, e houve quem quizesse marcar o tempo de sua maior intensidade no mez de Maio. Comtudo, nada ha de positivo e de absoluto a este respeito. O que é certo é que a coincidencia (não sempre) do seu apparecimento durante a colheita do feno, fez crer a alguns autores que talvez a inspiração do pó d'esta planta, influisse na sua pathogenia, facto erroneo contra o qual protestaram com toda a razão Dechambre e Phabus de Giessen.

As opiniões ácerca da natureza da molestia eram muito uniformes até pouco tempo: uns, como Parrot, consideravam-na como uma forma especial de asthma, outros, como o redactor em chefe da *Gazeta hebdomadaria*, oppuseram-se a este modo de pensar, referindo a origem do mal a dous elementos

distinctos—o espasmodico e o catharral: alguns finalmente, como See, diziam:—que o predominio do catharro nas mucosas nasopharingianas, a oppressão continua e diurna, a duração dos accessos e a sua repetição em uma epocha determinada, aproximavam mais esta molestia da classe das affecções catharraes, do que da asthma simples. De tudo isto se depreheende uma cousa, e é que a febre do feno, cuja séde de predilecção se limita ás mucosas do apprelho respiratorio, desde as fossas nazaes, pharinge, larynge, até as ultimas ramificações bronchicas apresenta varios symptomas particulares, que fazem della senão uma individualidade morbida a parte, pelo menos um typo diverso da asthma e da affecção catharral propriamente ditos. Entretanto, ficou acceto entre os autores que escreveram sobre esta materia, que a *hay-fever* era devida a certas disposições organicas dos individuos, e a causas perturbadoras ligadas ao calor, á humidade, em fim a condições meteorologicas especiaes.

Veio, porém, o Sr. Geneau de Mussy dar uma nova phase á etiologia obscura da febre do feno, e, assim como outros factos de diversos clinicos, a minha observação vem em appoio da opinião do illustre especialista francez.

É opportuno declarar agora um commemorativo que obtive da minha doente, depois da leitura de seu trabalho, que vem publicado na *Gazeta hebdomadaria*. A rapariga tem soffrido por mais de uma vez de erupções cutaneas, que n'ella se apresentam sob a forma papulosa, accommettendo sobretudo as pernas, e determinando um prurido intenso, seguido de calor e ás vezes de dores intoleraveis.

Além d'este incommodo, que julgo ser a urticaria, a doente tem tido insultos terriveis de rheumatismo articular, e de uma vez foi tão geral, que a prostrou por muito tempo *entrevada* no leito.

Ora, para o Sr. Geneau do Mussy a rhinobronchite espasmodica ou febre do feno, não é outra cousa senão a manifestação do arthritismo, semelhando certas dermatoses arthriticas, como a *urticaria*, com as quaes tem ella intimas connexões pathogenicas, e dando logar para as membranas mucosas um processo morbido analogo as que caracteriza sobre a pelle esses pseudo-exanthemas.

Os factos colhidos por differentes clinicos

da França e da Inglaterra tornam incontestevel este modo de pensar. Não me posso furtar ao prazer, e n'isso dou algum valor ao que vae por abi escripto n'esta nota, de transcrever as considerações que precedem a innumeração dos factos observados pelo Sr. de Mussy.

A asthma do feno, diz elle, me parece ser devida ao arthritismo, como a verdadeira asthma, como a enxaqueca periodica, como a maioria das nevroses periodicas constitucionaes. Nem só veremos a affecção das membranas mucosas alternar com a da pelle senão que poderemos seguir a passagem do trabalho morbido de um tegumento a outro.

Resta a resolver uma questão que se suscita sempre que se trata de dermatoses mucosas. O processo morbido apresenta no tegumento interno a mesma forma que o caracteriza na pelle? As differenças de estrutura que se notam entre as duas grandes divisões do envolvero tegumentario fazem pressuppor qualquer dissimilhança, ou quando menos variações entre suas manifestações morbidas, mas, o que é certo é que abi se encontram os caracteres fundamentaes d'ellas. Demais, que differença essencial existe entre o erythema cutaneo e a congestão chronica das membranas mucosas?

Na maior parte dos casos, as affecções do tegumento interno podem se assemelhar ás dermatoses externas, e provém das mesmas condições pathogenicas. Tentei estabelecer essa ligação e similhança, já admittidas pelos clinicos do XVII e XVIII seculos, na angina glandulosa, em certas formas de catharro pulmonar, de diarrhéa chronica, e em algumas molestias internas: ella se verifica em muitas dyspepsias, gastralgias e uteralgias que são dermatoses gastricas e intestinaes.

Não faltam dados para se esboçar o quadro das dermatoses mucosas. Abi vamos nós encontrar essas grandes linhas diathesicas que servem de base á classificação das dermatoses cutaneas. A gotta e a escrophula dominam a scena morbida, e apresenta-se como condição primordial, da maioria das affecções do tegumento externo.

Perguntar-nos-hão ainda, se a corysa espasmodica exige sempre esse elemento exanthematico, ou por outra, se ella é seguida de uma dermatose mucosa? Pode uma nevrose arthritica sem lesão primitiva da membrana mucosa, produzir as perturbações funcionaes, observadas nessa curiosa doença?

A priori não se pode registrar a possibilidade deste facto; porém, quando a observação demonstra o modo de ser de um processo morbido, não basta a analogia das perturbações funcionaes para que se deva incluir na mesma especie morbida um incommodo que apresenta um processo essencialmente diverso. A conexão pathogenica fixaria uma relação mais intima e um mais legitimo aproximamento: ha affecções dyspneicas, periodicas, complicadas de uma hyperemia mucosa que provem, como na asthma do feno, da raiz arthritica, e que podem ser consideradas como nevroses, porque o elemento nervoso precede e domina o elemento congestivo: mas taes affecções ligam-se mais à verdadeira asthma do que ao *hay-fever*. Cumpre que acrescentemos com antecedencia que estas duas formas morbidas, embora distinctas, têm entre si immensas affinidades.

Não é simplesmente pelo seu desenvolvimento nas familias gottosas, e pela sua alternancia na raça ou no individuo com as manifestações francas da gotta, que os derivados do arthritismo atraçoam a sua origem. Qualquer que seja a sua dissimilhança do typo primitivo, ficam-lhes sempre alguns traços d'este, e ha entre os rebentos da raiz gottosa caracteres communs, um *ar de familia*, que a analyse clinica nos descobre.

Assim, em todas as doenças que dimanam do arthritismo, vemos o elemento nervoso representar um papel importante: na maioria dos casos, verificamos uma tendencia visivel para a periodicidade. De ordinario as manifestações artriticas vem sob a forma de accessos de duração variavel, seguidos em muitas occasiões de exacerbações nocturnas. Não é raro vê-las se repetirem no outomno e na primavera, isto é, em condições de estação nas quaes apparece de preferencia a gotta.

Todavia, com quanto estes caracteres sejam frequentes ou communs nos derivados arthriticos, não se pode contar sempre com elles. Quanto mais os derivados da gotta se affastam da origem primitiva, tanto mais se poderão elles desviar da forma typo, sobretudo quando, como consequencia necessaria d'esse affastamento, a influencia gottosa que elles exprimem tiver se crusado e muitas vezes se modificar sob a acção de outros elementos diathesicos ou constitucionaes. Além disso, encontram-se na fórmula typo, na pro-

pria gotta articular, algumas variedades que se notam entre os derivados arthriticos.

Se a gotta ordinaria se manifesta debaixo da fórma de accessos de limitada duração, em certas condições constitucionaes, a fluxão articular não tem a marcha e a resolução do costume: pode ella persistir por um longo espaço de tempo. Esta chronicidade, no sentido etymologico da palavra, é muito mais commum entre os derivados do arthritismo e nas dermatoses arthriticas em particular: observam-se affecções cutaneas arthriticas, bem como catharros intestinaes ou bronchite de igual natureza, que duram indefinidamente.

Em opposição, se ha d'esses phenomenos gottosos que se tornam rebeldes, ha os tambem passageiros, fugitivos, caracterisados por dores lancinantes, fulgurantes, ás vezes por fluxões congestivas ephemerias nas articulações. É este o typo morbido que se reproduz nas dermatoses arthriticas: o erythema fugaz, certas fórmas de urticaria palmar ou plantar, que duram de minutos a horas, os herpes periodicos que completam sua evolução em poucos dias e reapparecem ás vezes com intervallos regulares, representam na pelle aquellas manifestações passageiras do arthritismo. Encontraremos entre as dermatoses muccas analogias, que são, por assim dizer os esboços de fórmas mais caracterisadas e rebeldes.

Se muitas vezes falha nos derivados o arthritismo, a periodicidade nocturna ou de estação, convém dirigir sempre a observação para a fórma typo: ha gottosos que são mais atormentados de dia que de noite: outros têm accessos em todas as estações.

Admittida, depois destas considerações, a origem arthritica do rhino-bronchite espasmódica, não causará admiração que esta doença apresente variedades que diversifiquem em sua marcha, da fórma descripta sob a denominação de asthma do feno. Ellas se approximam entre si pelas suas localisações e pelas suas condições pathogenicas, e se eu quizer generalisar em excesso as observações colhidas n'estas condições, poderia resumil-as dizendo que esta affecção tem por caracter fundamental uma rhino-bronchite espasmódica ligada a uma *arthridite mucosa*.

Pouco me resta accrescentar depois das reflexões importantes que acabo de transcrever. Na minha doente a molestia coinci-

dio com o arthritismo, e naturalmente a manifestação da fluxão exanthematica para as mucosas determinou os accessos de espirros (*corysa espasmódica*) e a congestão broncopulmonar, devida naturalmente á propagação do exanthema interno pela arvore respiratoria do que resultou por diversas vezes a hemoptisis. Considerando o caso por esta nova fórma, mediquei a doente conforme os conselhos do especialista francez aconselhando-lhe o uso da solução arsenical de Fowler, bem como o sulphato de quinina. A rapariga deixou a terra, ha dous mezes tendo tido um periodo bastante longo de melhoras, que até hoje não se tem desmentido.

É portanto, mais um factó a registrar e digno de ser incluído entre os da clinica do Sr. Gueneau de Mussy.

Theresopolis, 20 de Julho de 1872.

—  
APONTAMENTOS PARA A REFORMA DO HOSPITAL  
PEDRO II EM PERNAMBUCO

Em todas as epochas e em todos os paizes, onde o progresso e a civilisação tem chegado a sua méta, o que prende mais a attenção social é a fiel observancia dos preceitos hygienicos e os cuidados a empregar-se com a salubridade publica. É assim, que nas mais antigas eras a fiel observação d'aquelles preceitos, eram considerados como dogmas religiosos, os quaes se não podiam infringir sem commetter um peccado, do qual deviam esperar severa punição do ceu.

A criação de hospitaes, idéa esta a mais cevilisadora e humanitaria que tem sido realisada pela sociedade, data de longos e remotos seculos, propagando-se em todas as nações, e indo de dia a dia ampliando-se como a mais util de todas as instituições sociaes.

A repugnancia, que a principio experimentavam os povos a recorrer a esses estabelecimentos, tem sido vencida, pelas reformas, que tem soffrido na sua organização.

A idéa de separação da familia, na occasião mais critica da existencia, trocando os doces carinhos de uma terna e extremosa mãe ou consorte, pelos toscos cuidados de um rude enfermeiro, produzia nos enfermos um horror tal, que preferiam mendigar pelas ruas da cidade, e exhalar o ultimo suspiro nos alpendres e praças publicas, á recolherem-se onde poderiam encontrar lenitivo a todos os seus padecimentos. Felizmente, ou pelo progresso da civilisação, ou