

Simples nos seus resultados, mas complicada pela multiplicidade dos tramites que é preciso transpôr para ser devidamente aquilatada, necessita de profundas indagações; não sendo licito a qualquer, sem estes subsidios, julga-la cabalmente. Não basta tê-la ouvido referir; é preciso conhecê-la intimamente para com justiça aprecia-la; o que occorre aqui advertir reiteradamente, afim de procurar pôr um paradeiro á leviandade com que frivolamente se tem pretendido com desdem illaquea-la.

NOTICIARIO

Paralysis algida dos nervos vaso-motores.
—No serviço clinico do Dr. Luigi Concato appareceu um individuo de quarenta e cinco annos de idade. Aos vinte e quatro começou a soffrer violentas cephalalgias de caracter periodico, que desappareceram depois de copiosas sangrias. Dos vinte e quatro aos trinta teve uma hemorragia, e depois uma ulcera glandulosa. Aos quarenta manifestaram-se-lhe em diferentes pontos do corpo pequenos tumores, que foram considerados como gomas syphiliticas, desaparecendo sob a influencia do iodureto de sodio e banhos de vapor.

Giovannini vivia muito contente pelo seu bom estado de saude, postoque percebesse em si um certo emagrecimento lento. É conveniente notar que aos trinta annos, no inverno, os pavilhões das orelhas e a ponta do nariz começavam por tornar-se vermelhos, passavam depois ao branco, e finalmente produzia-se uma certa descamação, cobrindo-se de crostas. Os mesmos órgãos estavam então extremamente frios e dolorosos ao contacto. Todo o tratamento foi inefficaz.

Na primavera a doença desapparecia, passando o doente muito bem o estio e outomno, até que o novo inverno trouxesse a repetição dos phenomenos já descriptos, e que tendiam a aggravar-se de anno para anno. No dia da sua entrada no hospital apresentava os seguintes symptomatmas:

As duas mãos, no momento em que foram retiradas do leito estavam quentes e com a sua côr normal; uma côr mais avermelhada, desapparecendo á pressão, manifestava-se na face palmar e ao nivel das terceiras phalanges. O dynamometro indicava uma

potencia muscular de 240° a 250°; a temperatura tomada entre o pollegar e index era de 35°. 8; na axilla, de 36°. 8. As orelhas e nariz apresentavam uma côr livida. Descobertas por pouco tempo tornavam-se de um vermelho vivo e frios como marmore.

Fez-se levantar o doente, que passeou no corredor do hospital vinte e cinco minutos. As mãos tornaram-se tumefactas e tomaram uma coloração livida tão intensa, que pareciam ter sahido de um banho de anil.

O doente conservava-as em flexão e desviadas do trônco, mostrando assim que o menor contacto lhe era extremamente doloroso.

Algumas picadas feitas com um alfinete produziram uma hemorragia muito abundante. A temperatura entre o pollegar e o index não era de mais de 20°.6; na palma da mão de 23°.4; na axilla, 36°,8; a agulha do dynamometro indicava apenas 75°.

Os dedos dos pés estavam vermelhos, frios e dolorosos. O thermometro posto entre 2° e 3° dedo marcava 20°.2. Uma hora depois de collocado o doente na cama, as mãos e pés retomavam o seu aspecto normal e funcções, e só persistia a côr livida das orelhas e da ponta do nariz.

O professor Concato diagnosticou—uma *paralysis algida dos nervos vaso-motores*, devida a influencia do frio—e mandou que lhe fosse applicada a electro-therapia com as correntes de indução.

O tratamento começou pela applicação dos reophoros sobre o tracto do nervo mediano ao nivel da parte inferior do antebraço, dando á corrente uma direcção descendente. Os resultados foram nullos, ficando tudo no mesmo estado.

Collocando os dois reophoros na face palmar do antebraço haviam grandes contractões musculares; levando-os ao nivel das partes frias, não havia contractão. Do mesmo modo se se applicava o reophoro positivo sobre um ponto qualquer do antebraço e o negativo sobre os órgãos frios.

Isto provava que os musculos situados no meio das partes resfriadas se tinha tornado insensiveis ao estimulante electrico e esta *acinesia* era devida, segundo a opinião do dr. Concato, não a uma abolição idiopathica da contractilidade muscular, mas sim a uma *paralysis especial dos nervos motores*—*anervia mortifera*. Continuou-se a fadurisação: na quinta sessão manifestaram ligei-

ras contracções nos musculos que estavam insensíveis. A 19.^a sessão a contractilidade estava completamente restabelecida.

Estes resultados levam a crer que o melhor tratamento contra estes e outros accidentes produzidos pela acção do frio, seria a electricidade.

Das complicações cardiacas na blennorrhagia—As relações entre as blennorrhagias e as affecções das serosas estão perfeitamente estabelecidas e admittidas actualmente por todos os pathologistas.

O Dr. Lacassagne colligiu nove observações, nas quaes a blennorrhagia se acompanhava constantemente de arthrites multiphas de tal modo que a affecção das serosas cardiacas pôde ser considerada como uma localisação do reumathismo blennorrhagico.

No decimo caso, que é do proprio author, a blennorrhagia deu uma pericardite, sem que se houvessem manifestado phenomenos morbidos nas articulações. O Dr. Lacassagne deduz do seu trabalho que as complicações cardiacas são muito raras, e que o mezo-cardio, talvez ás vezes o endocardio, mas especialmente o pericardio são atacados n'este caso.

A farinha de aveia na alimentação das creanças—Segundo os Drs. Dujardin Beaumetz e Ernest Hardey o valor nutritivo da farinha de aveia, comparado com o de outros alimentos, especialmente os empregados na alimentação das creanças pôde classificar-se do seguinte modo:

	Elementos plasticos	Elementos respiratorios
Farinha de aveia.....	40	35
Leite de mulher.....	40	38
Leite de vacca.....	40	30
Leite de vacca sem nata	40	25
Farinha de trigo.....	40	50

A quantidade de ferro contida nas materias mineraes retiradas d'esta farinha é consideravel. Boussingault achou, por analyse, os seguintes algarismos:

Aveia	0,0131
Pão branco.....	0,0041
Leite de vacca.....	0,0018
Milho.....	0,0036
Carne muscular de boi.....	0,0048
Lentilhas.....	0,0083

N'estas analyses o ferro é expresso no estado metallico e corresponde a 100 gram-

mas de substancia. A quantidade de azote contida na aveia é mais elevada que nos outros cereaes; contem 2 %, enquanto que nas outras farinhas, acha-se para o trigo, 1,64; para o centeio, 1,75; para arroz, 1,08.

Administra-se a farinha de aveia macepada no leite, e depois submettida a uma ligeira cocção, depois de separada convenientemente em particulas mais grosseiras. Da-se d'esta geleia um copo por dia, podendo augmentar-se a dóse.

Gelo no recto para combater a narcose chloroformica.—Segundo o Dr. Baillée, não ha meio mais activo contra a narcose produzida pelo chloroformio do que um bocado de gelo introduzido no recto. Uma pressão moderada basta para vencer a resistencia do sphincter. O gelo funde-se no intestino e immediatamente se produz uma inspiração profunda, precussora da respiração natural e do restabelecimento das funcções cardiacas. O Sr. Baillée recommenda este meio nos casos de morte apparente dos recém-nascidos.

FORMULARIO

Pomada destruidora das verrugas.

Chromato de potassa..... 50 centigr.^a
Manteiga..... 8 gramm.

Friccionando as verrugas, duas ou tres vezes por dia, com esta pomada, desaparecem as verrugas ao fim de duas ou tres semanas.

Pó d'amydo phenicado (Sanson).

Acido phenico..... 5 grammas
Alcool de 90%..... 5 grammas
Amydo em pó..... 100 grammas

Dissolve-se o acido no alcool em gral de vidro, e se lhe ajunta o amydo por trituração. A proporção do acido pôde ser augmentada ou diminuida como convier. É recommendado como um bom desinfectante.

Pó de carvão phenicado (Sanson).

Acido phenic..... 5 grammas
Alcool..... 5 grammas
Carvão em pó..... 100 grammas

Prepara-se como o antecedente, e é recommendado para os mesmos usos, por seu um bom desinfectante.