

tassa, destinada aos usos cirurgicos, é incolor, viscosa; deve marcar 33 grãos Baumé, iguaes a 1,298 de densidade.

Eis-aqui como se prepara: N'uma fornalla de reverbero, de forma elliptica, aquecem-se, até ao rubro branco, durante quatro horas, 630 kilogrammas de areia com 330 kilogrammas de carbonato de potassa. Obtem-se assim 845 kilogrammas de vidro transparente, incolor ou levemente amarelado. Para dissolver o vidro assim formado, introduz-se, reduzido a fragmentos, na agua, a qual se eleva á alta temperatura, n'esse vaso ferreo. O silicato de potassa, empregado na cirurgia não é, pois, outra cousa senão o *vidro liquido*, designado antigamente debaixo do nome de *licor de calhãos*.

Todos os silicatos de potassa, do commercio, não apresentam as qualidades adhesivas necessarias para a boa confeição dosapparelhos das fracturas. É necessario, pois, antes de empregal-os, verificar as suas propriedades. Um meio simples consiste em dar voltas ao redor de um cylindro de páo, de cerca de 5 centímetros de diametro, com a atadura molhada no silicato de potassa, o que permittirá julgar do poder adhesivo da substancia, e do tempo necessario para a sua desecação.

Pariz 18 de Junho de 1874.

## CORRESPONDENCIA

### ESTADO SANITARIO E FACTOS CLINICOS NO CEARÁ

*Meu collega.*—Volto de novo as columnas do seu conceituado jornal para cumprir o dever que muito me honra.

De regresso da minha excursão ao centro da Provincia reassumi o exercicio da minha clinica civil, militar e do hospital, por pouco tempo interrompida.

Os casos mais communs que tenho tido têm sido benignos, a excepção do 2 de vomito negro, que foram fataes á dous individuos de fora da Capital—isto prova iuda que, onde uma vez houve vomito negro, nunca mais se extinguiu a nodoa dessa filha de São.

Todos os annos, quasi sempre, por esta epoca, depois que ella aqui esteve epidemicamente (1851) alguns casos fazem uma, ou duas victimas!

As intermittentes, em fins d'agua, como

como se diz vulgarmentê de concumitancia se apresentam; o que fizera talvez Chervin dizer que ellas são idênticas.

No hospital, na minha enfermaria de mulheres, mais do que nas de homens ellas me tem feito, na maior parte dos doentes, suspender a medicação seguida e dar o q. q.—para cortar ligeiros accessos.

Um caso de febre perniciosa de forma abdominal e em que o doente rejeitava, ao mesmo tempo, materia biliosa pelo vomito e nidorosa insuportavel, pelos frios, foi combatido pelo q. q.—*larga manu*.

Nesse doente deu-se mais a singularidade que a proporção que os accessos não cedendo, caimbras e colicas intensas atormentavam-o. Na convalescencia uma dysenteria symptomatica desappareceu pela acção moderada do opio.

No meu fraco modo de pensar, quando o q. q., é necessario não ha contraindicção que suspenda a mão do medico e, se elle vacila e não se faz d'Edipo a *Sphynge* atira-lhe com o doente na sepultura!..

Na honrosa commissão de que fui injustamente incumbido pelo governo provincial, a fim de reconhecer a natureza e character de febres reconhecidas pelos habitantes da freguezia de Soure, foi lá, onde vi em maior escala o elemento paludoso fazer as mais bisarras manifestações e, não se afastando dos seus typos conhecidos por nos outros, estava e ainda está, não obstante as pequenas prevenções e auxilio prestado pela Presidencia, fazendo algumas victimas.

Alli a febre, em cada individuo, permittame a exaggeração, se apresentava por um cortejo insolito de symptomas; mas, no fundo desse quadro, via-se bem claro o miasma que, se não arrebatava o doente, deixava-o cachetico como uma rã.

A temperatura elevada da athmosphera, o solo baixo e humedecido por aguas estagnadas, tendo em decomposição materias animaes e vegetaes, davão, como a causa da febre.

O q. q. poderá, mesmo, destruir esse inimigo que de dia á dia se levanta em numero igual, ou superior? Creio que sim.

A proposito, dizia um medico illustre a um estudante que desconhecia uma manifestação paludosa, no meu tempo de Academia:—o paludismo, Sr., pode se apresentar por todos os modos que se queira imaginar!—

Um caso de febre typhica de forma thora-

xica transformou-se em intermittente e o q. q. foi ainda o heroe, não obstante o resen-timento pulmonar que só foi curado depois de jugulada a febre.

É esta a constituição medica que temos actualmente aqui

Alguns casos de distocia têm apparecido e não têm feito victimas, faltando-nos mesmo especialistas; porque o Dr. Ribeiro que mais se dedicava a isto, se acha bem doente e só cuida da sua saúde que é bem apreciada.

Ha poucos dias tendo sido chamado para ver uma doente que, me dizião, estava em trabalho de parto havia 5 dias; lá fui e encontrei uma mulher de constituição fraca de temperamento lymphatico, prostrada em um leito de lona, na maior miseria, ardendo em febre, com séde intensa, cephalalgia; vomitando bilis com eructações nidorosas, tympanismo; braço direito echymosado, uma asa do cordão umbilical de um feto em procidencia na vulva, que era incoberta pela vagina, procidente por sua vez! O liquido amniotico tinha sido expellido em totalidade e o orgão gestador estava fortemente retrahido sobre o corpo do feto e inerte! Tudo isto não me desanimou em tão urgente caso.

A mulher sendo posta em posição, e reconhecida a 2. apresentação da espadua direita, tentei logo a versão podalica por me ser mais facil em taes circumstancias.

Recolhi a vagina e introduzi a mão correspondente ao braço procidente e não podendo seguir o plano lateral direito do feto, nem mesmo, o anterior, como manda a regra, por causa da retracção do orgão e do esgoto do liquido, accompanhei o braço até sua axila e d'ahi, com a mão em pronação, comprimindo o ventre fetal, fui ter a prega inguinal direita; accompanhei o membro correspondente até ao pé que, sendo preso com firmeza, foi trasido para a vagina. A mão esquerda que apoiava o ventre veio segurar o pé direito em quanto eu fui procurar o esquerdo.

Feita assim a versão o feto veio em supinação, sem difficuldade alguma até a extremidade cephalica, cuja extracção, sendo trabalhosa deste modo, foi facil em posição opposta:—diametro occipito frontal com sacro pubiano, estando o feto de bruço.

A doente, em menos de 1/2 hora estava livre de um feto de termo, morto, á quem durante a vida a commadre havia puxado

pelo braço e cordão deixado no estado em que o vimos e a parturiente em condições de uma morte proxima, tendo-se ausentado, como ella propria diz! Não sei, se por ahi, como por aqui, ellas fazem disto. E [a lei?... Não houve proposito talvez!

Acába de entrar para o hospital um doente victima de uma desgraça, como eu ainda não tinha visto, e que faz horror referir-se.

Estando em Mecejana a raspar e comer ametade de um côco, um individuo, de instinctos perversos, aproximou-se d'elle e apanhando-o de surpresa e desfeixando-lhe um golpe certo e vigoroso nas articulações do punho, decepou-lhe, incontinente, as duas mãos que cahirão com a mesma rapidez do golpe!!!

O instrumento tão atiado estava que cortou como raio 13 ossos enumerados assim; 4 metacarpianos, 4 ossos proprios do carpo esquerdo, 4 direitos e o rebordo da cabeça do cubito correspondente!!!

Tanta perversidade só se explica pelo acaso!

O doente soffreu ainda a amputação do braço em que a desarticulação não podia ser aproveitada, e não querendo ser chloroformisado, com o maior heroismo deixou ser operado.

Um outro doente tambem se recolheu a minha enfermaria para ser curado de fractura da rotula esquerda em consequencia de escorrego e queda no passeio da rua. E' uma fractura de difficil reunião e de custosa consolidação.

Na enfermaria das mulheres tive um caso de ovarite chronica direita bem pronunciada e em que tirei muito bom resultado, curando radicalmente a doente, pela applicação interna do iodureto de potassio, tendo por vehiculo o xarope de genciana na formula de que uso e que é a seguinte:

Xarope de genciana . . . . . 60 gram  
Iodureto de potassio . . . . . 1/2 »

Para tomar em duas porções, de manhã e a noite.

Conservando o mesmo vehiculo eu mando augmentar todos os dias 1/2 gram. até 4, quantidade de que mando diminuir na mesma proporção até a primitiva.

Raro é o doente que não se cura dos accidentes secundarios e mesmo terciarios da syphilis, ao menos por algum tempo, quando o mercurio não produz effeito ou o doente não póde toma-lo.

Esta ovarite seria combatida por outros meios se a doente não se queixasse de dores rheumaticas, razão porque submetti-a logo ao iodureto e, vendo que o medicamento foi repercutir no ovario, como que tornando agudo o estado chronico, dei um purgativo e continuei a prescripção auxiliando-a com as fricções da pomada da mesma substancia sobre o tumor.

Se não tivesse um collega observado comigo uma cura singular pela applicação desta formula, eu não lh'a refereria. E' ella a seguinte:

Uma escrava do Dr. M. P., sendo recolhida ao hospital para ser tratada de leuchorrhéa e de polypo na fossa nasal direita que não foi logo operado porque não era urgente e eu andava muito occupado, foi submettida a essa prescripção e a proporção que a leucorrhéa melhorava a preta me dizia que ia melhor da *intopição*, como ella chamava, e, no fim de alguns dias vi admirado que o polypo se reduzia muito, e como continuação do remedio, se atrophiou a ponto de ficar reduzido a uma pequena crosta que destaquei com grande facilidade sem deixar vestigio.

Aqui como ali de uma cajadada matei dous coelhos, como diz o rifão.

Taes são, meu collega, os casos mais importantes da clinica que tenho tido, desde a minha volta até agora.

Em algumas localidades interiores as febres paludosas fazem victimas.

No Pereiro a variola, de character epidemico, tem tomado proporções que reclamão sèrias providencias de quem compete da-las:

Se não lhe refiro estas observações, cada uma de per si, com os seus pormenores é porque seria fastidioso; e de mais, sendo a observação escripta massante quando é bem feita, é insuportavel mal feita, como as deste seu collega, que não tem razão para abusar da condescendencia dos leitores. Os factos existem e é do meu dever narral-os mesmo assim.

*Longum iter per procepta, breve per exempla.*

Dr. Melon da F. Alencar.

## VARIÉDADE

### OS GEMEOS SIAMEZES

Todos os jornaes noticiaram o fallecimento dos dous irmãos indianos, unidos pela natureza, e que por mais de meio seculo causaram admiração de sabios e curiosos de todo o mundo civilizado. Agora que a morte quasi simultanea de ambos revelou o mysterio d'aquella mutua prisão, que tantas conjecturas suscitou entre os homens da sciencia, julgamos satisfazer a curiosidade dos nossos leitores offerecendo-lhes o interessante artigo em que a *Lancet* de 14 de março ultimo, baseada no relatório dos medicos americanos que fizeram a autopsia, revela o que n'este extraordinario phenomeno havia de real e positivo, pelo que respeita ao laço de união dos dous celebres irmãos siamezes.

A traducção do artigo d'aquelle semanario de Londres é do Sr. Dr. J. B. Bueno Mamoré, joven e talentoso medico do Pará, a quem pedimos venia para o trasladar para as nossas columnas.

Recebemos afinal o relatório da commissão nomeada para o exame necroscopico dos gemeos Siameses.

Não é a todos os respeitos uma peça completa, desde que omittem-se as condições dos órgãos thoracicos, bem como os do cerebro.

Como annunciamos, os cadaveras foram logo embalsamados por meio de uma solução de chlorureto de zinco, que serviu para a injecção empregada.

As duas arterias iliacas direitas foram isoladas em ambos os individuos e a injecção foi primeiro empregada na aorta até que apparecesse nas incisões praticadas nos dedos e depois das iliacas, até surgir nas que se fizeram nos artelhos. Feito isto, a ineisão foi prolongada de cada lado, até á margem do laço connectivo que prendia os dous corpos, passando-se em seguida ao estudo do tecido do mesmo laço. Os operadores foram o Dr. Wm. H. Pancoast e professor Harrison Allen, cujo relatório foi lido n'um *meeting* especial da junta medica de Philadelphia, na quarta feira 19 de fevereiro ultimo.

O Dr. W. S. Ruchenberger, d'armada americana, presidia o acto, achando-se tambem presenteo Dr. Hollingsworth, que era o medico assistente dos gemeos.

Sobre uma mesa preparada, achavam-se os