

Tratamento hypodermico dos tumores indolentes dos ganglios cervicaes.—O Dr. Morrell Mackenzie recommenda as injeções de acido acetico como o meio proficuo de obter a cura radical d'estes tumores, evitando as cicatrizes que deixam após si. De 27 doentes tratados por este methodo 15 ficaram completamente curados, houve resorpção completa dos tumores; 4 melhoraram sensivelmente; em 5 houve suppuração; e 3 deixaram o tratamento antes de resultado algum notavel. Mackenzie injectava de 10 a 20 gotas, conforme o tamanho do tumor; termo medio, 7 ou 8 gotas; uma injeção somente por semana. O liquido deve ser injectado exactamente no meio do tumor. Se a injeção é muito superficial dá-se ordinariamente a suppuração, e o mesmo se dá se a injeção é repetida com pequeno intervallo. Quando dá-se a suppuração o pus deve ser extrahido com a seringa ou com o aspirador pneumatico. O tratamento dura, termo medio, tres mezes. As injeções de nitrato de prata, n'uma soiução de 1:8, produzem a destruição dos ganglios, ordinariamente pela suppuração; as de acido acetico na proporção já citada provocam a resorpção. Com o nitrato de prata, uma a quatro injeções produzem geralmente aquelle resultado; o effeito é mais prompto do que pelo outro tratamento, mas é menos satisfactorio o resultado por que ficam após ellas indurações que persistem. De 5 casos ficaram 2 incompletamente curados. (Medical Times and Gazette, 1875.)

Resecções do nervo dentario inferior.—O Dr. Mensel, assistente da clinica do professor Billroth de Vianna, praticou esta resecção pelo processo de Paravicini, com tão feliz resultado, que lastima que esta operação não seja praticada mais frequentemente pelos cirurgiões.

Foi o caso d'uma rapariga que soffria d'uma nevralgia violenta do nervo dentario inferior direito, e em vão tinha experimentado todos os remedios applicaveis. O Dr. Mensel fez a operação pela cavidade bucal, incisando a mucosa e despegando-a, assim como o musculo pterygoidiano interno do bordo anterior do ramo do maxillar inferior; afastou para dentro o musculo e o nervo lingual, e prendendo o nervo dentario inferior excisou d'elle uma extensão de tres linhas.