

em 3 grammas de espirito de vinho) para 15 grammas de banha de porco, applicada pela manhan e á noite. Na angina com abcessos, na stomatite, etc., os gargarejos de acido salicylico foram seguidos dos melhores resultados.

Internamente empregou-o Wagner com vantagem em casos de catarrho chronico do estomago, dysenteria, e caneros do pyloro, nas diversas molestias em que se dava a decomposição do conteúdo do estomago ou intestinos.

Wunderlich, professor em Leipzig, recommenda seu uso interno em forma de emulsão: acido salicylico 1 gramma, oleo de amendoas doces 20 grammas, gomma arabica 10 grammas, xarope de amendoas 25 grammas, agua de flores de laranja 45 grammas. Kolbe experimentou em si mesmo até a dose de 1 e 1 1/2 grammas por dia, sem sentir o menor incommodo.

Na diphteria e em geral nas molestias produzidas por *organismos inferiores* a applicação interna e externa são de excellentes resultados. No croup deu Wagner com vantagem 15 a 30 centigrammas de acido salicylico em pó de 2 em 2 horas, e a creanças maiores ao mesmo tempo gargarejos com uma solução de 1,5 gram. de acido salicylico, 15 gram. de alcool rectificado e 150 gram. de agua distillada, de hora em hora.

Tinctura de guaiaco na tonsillite aguda.—No Philadelphia med. and surg. Reporter, vol. 31, pag. 362, louva o Dr. Fitzinger a acção efficaz d'este tratamento. Emprega uma mistura de 4 grammas de chlorato de potassa, 15 grammas de ether nitrico, e 45 de tinctura de guaiaco; para tomar 3 vezes por dia uma colher de chá diluida em agua com assucar, engolindo-a lentamente. Esta mistura exerce uma acção adstringente sobre a mucosa, e além d'isto produz a diaphorese e a derivação intestinal.

A tinctura de cannabis indica nas metrorrhagias puerperaes.—O Dr. Donovan n'uma carta dirigida á Sociedade de Gynecologia de Edimburgo mostra a utilidade d'esta tinctura nas metrorrhagias puerperaes e nas menorragias. Com uma dóse de 20 gotas poude elle constantemente suspender