

perências, nas quaes se tinham reunido todas as circumstancias favoraveis a esta transformação.

9. É portanto impossivel admittir por ora que os organismos inferiores sejam a causa unica e bastante das molestias infectuosas. (*Medical Record*, New-York, Dezembro, 1875).

Envenenamento d'uma creança pelo leite materno.—Em Manchester teve lugar um inquerito sobre a morte d'uma creança de dous dias, que tinha nascido san, e inesperadamente foi encontrada morta em seu berço. Soube-se que a mãe fazia um consumo consideravel de opio. O marido chamado para depôr declarou que ella tomava pelo menos uma boa onça de opio por semana. Elle mesmo tinha levado sua complacencia ao ponto de conseguir uma provisào para seis mezes, por intermedio de um seu irmão que é droguista.

O Dr. Fletcher declarou que não podia attribuir a morte senão ao veneno contido no leite materno.

O veredicto aconselhava ao marido que fizesse algumas modificações nos habitos hygienicos de sua mulher. (*The Medical Presse*, Dezembro, 1875.)

Injecções intersticiaes nos tumores do baço.—O professor Mosler apresenta um meio que sem os riscos da extirpação do baço, tem por fim curar os tumores d'este orgão, e consiste nas injecções intersticiaes, que teem sido praticadas com bom resultado nas hypertrophias ganglionares. Fez duas injecções na mesma doente com um mez d'intervallo, da primeira vez com 20 gotas d'uma soluçào de acido phenico (de 2:100), e da segunda vez com a mesma quantidade de licor de Fowler diluido em dez partes d'agua.

Por precauçào foi mantida uma bexiga de gèlo sobre a região splenica muitas horas antes e depois da operaçào; a primeira injecção só provocon uma dór um pouco persistente, mas não houve phenomeno algum de reacção. Foi notavel a retracção do baço. A hypertrophia era consecutiva a febres intermittentes e á febre typhoide. (*Deutsches Archiv. f. Klin. Méd.* 1875, 15.)