

REVISTA DA IMPRENSA ESTRANGEIRA

OBSTETRICIA E GYNECOLOGIA.

Prenhez extra-uterina de vinte e oito annos de duração, terminando pela extracção do fêto pelo recto.—O Dr. E. Kuster referio á Sociedade de Gynecologia e Obstetricia de Berlim uma das mais raras observações d'este genero.

«A paciente, hoje com 59 annos d'idade, teve duas vezes, aos 20 e 22 annos, partos de termo. Sete annos depois, em 1847, concebeu pela terceira vez, e teve todos os symptomas, que já conhecia pelas prenhez anteriores. Na epoca em que esperava dar á luz, appareceu n'um dia de repente um fluxo de grande quantidade d'agoa sanguinolenta; as dôres porém não appareceram, e pelo contrario pouco a pouco cessaram completamente os movimentos do fêto, até então muito activos. Depois de quatro semanas veio de novo a menstruação, e d'ahi em diante voltava regularmente; o corpo conservou-se volumoso, e somente depois de 4 annos diminuiu quando a paciente soffreu um emmagrecimento geral.

Dez annos depois d'este facto soffreo ella d'uma inflammação, abcesso na articulação da escapula direita, e catarrho pulmonar com escarros muito fetidos. Um anno mais tarde soffreu de novo algum tempo dôres no quadril direito. D'ahi em diante gosou saúde até o começo de 1873 em que soffreo d'uma febre gastrica. Em 1874 adoceco de novo com violentas colicas, diarrhéa e tenesmo.

Em Julho d'esse anno observou ella pela primeira vez que expellio nas dejecções pequenos fragmentos de ossos e procurou por isso a Policlínica da Maternidade Real.

Ahi reunio 50 ossos expellidos pouco a pouco. No começo de 1875 entrou para o hospital Augusta por causa d'uma diarrhéa. Estava então muito magra, e abatida. Pelo exame vio-se que o utero era impellido contra a symphyse pubiana por um tumor de signal, maior do que um punho.

Do recto sahia um liquido fetido que procedia d'um orificio do tamanho de 5 Groschen (pouco mais ou menos o diametro d'uma

moeda de 500 réis) que existia na parede anterior do recto, e no qual estava atravessado um osso. Foi este extrahido immediatamente com uma pinça, e depois d'elle em repetidas sessões todos os outros que se apresentavam ao exame. Somente os ossos do craneo offereceram grande difficuldade.

(No Hospital Augustia estão os fragmentos extrahidos: todos os ossos das extremidades, ossos da cabeça e a maior parte das costellas; faltavam os que tinham sido antes extrahidos, vertebrae, mãos e pés e algumas costellas.) A julgar pelo tamanho dos ossos o feto não estava ainda completamente desenvolvido, e sim provavelmente tinha morrido no fim do oitavo mez. A suppuração muito forte a principio foi sustada por injeccões de acido carbólico, e actualmente o tumor já desapareceu de todo, o orificio do recto fechou-se, o utero está em posição normal; existe somente uma suppuração moderada.

Kuster observa que n'este caso em vez de soffrer cedo a decomposição ou a expulsão com ruptura produzindo até a morte da paciente como em muitos casos, quer como em outros persistindo como um lithopedio até o fim da vida (cenhecem-se casos em que persistio por 40 e 46 annos), distingue-se o referido por que somente depois de 27 annos se deu a ruptura. A molestia que 9 annos depois da prenhez se manifestou por abcessos das articulações e escarros fetidos, pode ser considerada uma *pyemia*. A justificação e até urgencia da operação era ahí manifesta, e não se devia esperar.

Quando se pode determinar que um tumor existente no espaço de Douglas é devido a uma prenhez extra-uterina, logo que produz symptomas agudos, está justificada a extracção pela incisão do recto. (Beitrag zur Geburtshilfe und Gynaekologie, 4 Bd. 1 Heft.)

Applicação do forceps nos estreitamentos da bacia.—O Dr. Cohnstein publica nos *Archivos de Virchow* (vol. 64, 1. p. 82, 1875) um trabalho critico, estatistico e experimental sobre esta questão.

O autor mostra que ha casos de estreitamento de bacia nos quaes successivamente se offerece a questão do emprego do forceps ou da versão, como auxiliar do parto. A difficuldade está quasi constan-