

se pode deixar descoberta uma parte do membro é facil applicar-se este apparelho n'um doente que tenha fistulas.

O fletro plastico apresenta grandes vantagens. Tem quasi as propriedades da gutta-percha, porém é muito mais facil de manejá-la e amolda-se exactamente. Basta a agua fervendo para amollecl-o.

Tomando as precauções que indicamos, garantindo o membro com uma atadura enrolada, não se corre o risco de queimar o doente.

Além disto esta substancia é de preço pouco elevado, e se considerar-se que a maior parte dos apparelhos de coxalgia, salvo talvez o apparelho de gesso, tornam-se muito caros, concebe-se toda a utilidade d'este producto.

O Sr. de Saint-Germain o tem empregado além d'isto em muitos outros casos, diversos da coxalgia. Especialmente, como é uma substancia leve e muito resistente, elle o tem utilizado para immobilizar os joelhos rheumaticos n'uma couraça.

A immobilisação tem sido tão perfeita, sem vexame e sem pezo que doentes que tinham accusado no andar dôres muito vivas, poderam caminhar sem sofrer, e curaram rapidamente seu rheumatismo. (*Gazette médicale de Paris* n. 8—1876.)

Injecção de leite nas veias.—O Dr. Thomas teve de praticar uma ovariotomia dupla para a ablação de tumores solidos dos ovarios. Depois da operação cahio a doente em um estado de esgotamento completo, em consequencia de repetidas hemorrhagias uterinas. Parecia estar a ponto de succumbir, não podia mais tomar alimento algum, e o estado geral se agravaava cada vez mais, quando o cirurgião se decidiu a intervir d'um modo activo. Não lhe tendo dado resultados favoraveis a transfusão do sangue em tres casos anteriores, resolveo ensaiar a injecção de leite, com a qual parece ter obtido frequentemente bons resultados o Dr. Hodder na cholera asiatica. Injectou na veia mediana basilica oito e meia onças de leite fresco e puro.

Immediatamente depois da operação nenhuma melhora se produziu; pelo contrario elevou-se a temperatura consideravelmente, e o pulso chegou a 150 e 160 pulsacões por minuto. Em breve, porém, sobreveio uma mudança notável, a doente cahiu n'un profundo

somno, e rapidamente se dissiparam os symptomas assustadores. No fim de seis semanas estava em plena convalescência, e recuperava rapidamente suas forças e boa disposição. (*Medical Times and Gazette*, 19 de fevereiro de 1876.

Calculo do utero.—O Dr. Luigi Felici teve de tratar d'uma senhora de 34 annos, que era ha algum tempo sujeita a perdas abundantes, irregulares, dores lombares e o complexo dos pheno-menos morbidos que acompanham as affecções uterinas.

Feito o exame com o dedo e o speculum, pôude se verificar a existencia d'um calculo fixo no collo do utero, e que foi facil extra-hir com pinças.

Segundo o dr. Berti, que communicou esta observação á Academia de Medicina de Palermo, pode-se admittir a existencia dos calculos uterinos, porque os caracteres macroscopicos, microscopicos, e chimicos que elles apresentam, os differenciam das neoplasias degeneradas, calcificadas. (*Rivista clinica di Palermo*.)

Extirpação da glandula parotida.—O doente de 58 annos de idade, começou no correr de Março de 1874 a sentir, dôres lancinantes no interior da orelha esquerda; ás dôres se irradiaram pouco a pouco a toda a metade esquerda da cabeça.

O professor G. Corradi diagnosticou pelo exame um tumor da parotida comprimindo o facial. A sensibilidade e a temperatura do lado affectado eram normaes; o orificio palpebral esquerdo um pouco mais largo de que o direito; a commissura labial esquerda desviada para a linha media. Deglutição normal, nenhuma intumescencia no interior da cavidade buccal ou do pharynge.

No dia 11 de Dezembrô de 1874 foi praticada a operação por meio do galvano-caustico. O doente não quiz anesthesiar-se. Manti-a maxilla inferior para diante, tanto quanto possivel, foi feita uma incisão vertical da arcada zygomatica, um centimetro adiante do tragus, até um centimetro abaixo do angulo da maxilla inferior; e praticada uma segunda incisão horizontalmente do angulo inferior do masseter até a apophyse mastoide. Foram dissecados os dois retalhos com a faca galvano-caustica, e destacada a glandula começando pela sua parte inferior. Quando chegou-se á vizinhança