

somno, e rapidamente se dissiparam os symptonas assustadores. No fim de seis semanas estava em plena convalescença, e recuperava rapidamente suas forças e boa disposição. (*Medical Times and Gazette*, 19 de fevereiro de 1876.

Calculo do utero.—O Dr. Luigi Felici teve de tratar d'uma senhora de 34 annos, que era ha algum tempo sujeita a perdas abundantes, irregulares, dores lombares e o complexo dos phenomenos morbidos que acompanham as affecções uterinas.

Feito o exame com o dedo e o speculum, poudes se verificar a existencia d'um calculo fixo no collo do utero, e que foi facil extrahir com pinças.

Segundo o dr. Berti, que communicou esta observação á Academia de Medicina de Palermo, pode-se admittir a existencia dos calculos uterinos, porque os caracteres macroscopicos, microscopicos, e chimicos que elles apresentam, os differenciam das neoplasias degeneradas, calcificadas. (*Rivista clinica di Palermo*.)

Extirpação da glandula parotida.—O doente de 58 annos de idade, começou no correr de Março de 1874 a sentir, dôres lancinantes no interior da orelha esquerda; ás dôres se irradiaram pouco a pouco a toda a metade esquerda da cabeça.

O professor G. Corradi diagnosticou pelo exame um tumor da parotida comprimindo o facial. A sensibilidade e a temperatura do lado affectado eram normaes; o orificio palpebral esquerdo um pouco mais largo de que o direito; a commissura labial esquerda desviada para a linha media. Deglutição normal, nenhuma intumescencia no interior da cavidade buccal ou do pharynge.

No dia 11 de Dezembro de 1874 foi praticada a operação por meio do galvano-caustico. O doente não quiz anesthesiar-se. Mantida a maxilla inferior para diante, tanto quanto possivel, foi feita uma incisão vertical da arcada zygomatica, um centimetro adiante do tragus, até um centimetro abaixo do angulo da maxilla inferior; e praticada uma segunda incisão horisontalmente do angulo inferior do masseter até a apophyse mastoide. Foram dissecados os dois retalhos com a faca galvano-caustica, e destacada a glandula começando pela sua parte inferior. Quando chegou-se á visinhança