

com uma esponja lava-se, friccionando levemente, o couro cabelludo, e tendo cuidado de não enxugar as partes em que se passa a loção.

Ao contacto da solução com o couro cabelludo, experimenta-se um ligeiro calor e a pelle se torna rosea; isto só dura de um a dois minutos. No mesmo dia as comichões se tornam menos fortes; ás vezes desaparecem para não voltar mais. Nos outros casos obtem-se este resultado com as loções seguintes. Ao mesmo tempo cahem as pelliculas, e não se reproduzem mais.

Se continuar-se as loções durante um mez, tendo o cuidado de as fazer de manhã para evitar a humidade da cabeça durante a noite, obtem-se n'este curto intervallo de tempo a cura da pityriasis recente. A pytiriasis antiga cede aos mesmos meios, porém reproduz-se mais depressa. Logo que ha recabida, deve-se voltar ao emprego das loções de chloral, e insistir n'elle emquanto a pityriasis persiste, o uso continuo d'estas loções não apresenta inconveniente algum.

Quando a pityriasis é complicada d'erythema da pelle, de papulas de prurigo, e se a molestia é antiga, a solução de chloral simples é ás vezes impotente, e então se lhe substitue com vantagem a seguinte:

Agua,.....	500	grammas
Hydrato de chloral.....	25	» »
Licor de Van-Swieten.....	100	» »

(*Societé de Therapeutique*).

O emprego dos tecidos impermeáveis, especialmente do papel de caoutchouc no tratamento das molestias de pelle.—O Dr. E. Besnier (Bull. de Therap. v. 58º; pag. 49, 1875) considera o envolvimento das partes affectadas da pelle com os tecidos impermeáveis um dos maiores progressos na therapeutica das molestias da pelle.

O inventor d'este methodo foi, segundo este autor, o Dr. Colson em Beauvais, em 1869. Recommenda como materia mais appropriada o papel de caoutchouc fino ou o taffetá encerado, molle; estes tecidos devem ser bem limpos antes da applicação, lavados em agua fria, enxugados e depois applicados immediata e exactamente sobre a pelle doente. Estes envolveros podem ser applicados continua ou intermitentemente; e este methodo é o mais geral; applica-se o

envolucro á noite, quando o doente vai deitar-se, e retira-se pela manhã. Pelo curso do dia podem-se ainda fazer outras applicações.

Os effeitos immediatos d'estes envolveros são: secreção augmentada da pelle e diminuição do attrito pelas roupas, a pelle fica como que macerada, e seus productos morbidos são depressa destacados pela secreção augmentada do suor. Nas affecções de pelle que se accoñpanham de comichão incommoda, cessa esta logo depois da applicação do involucro. O author diz que nunca se observaram resultados nocivos d'esse methodo.

Este tratamento é indicadõ em todas as molestias de pelle que outr'ora eram habitualmente tratadas por cataplasmas e banhos repetidos, por exemp, no eczema, impetigo, ecthyma, lichen e especialmente em todas as formas de prurigo. É inutil ou em alguns casos completamente nocivo o involucro na psoriasis geral, no pemphigus, na erysipela e nas syphilides.

Referindo-se ainda a este trabalho de Besnier, B. Wenzel recorda que já em 1867, em consequencia de indicação do Prof. Hardy em Paris, o Prof. Hebra empregou com bom resultado o involucro com um tecido de caoutchouc vulcanizado, nas molestias acima indicadas, e entre ellas na ichthyosis, tylosis, pityriasis (Arch. f. Dermatol. und Syph. 1, 1869).

Recentemente o Prof. Pick (Prag. med. Wochenschrift, f. 1876) recommenda como de excellentes resultados o emprego do tecido de caoutchouc, que obra de modo especialmente favoravel nos processos morbidos accompanhados de grande secura da pelle, impedindo a evaporação da superficie cutanea. Em muitas formas de psoriasis é sufficiente para o tratamento o emprego do tecido gomado. O Prof. Pick mostra especialmente que com o emprego d'este tecido pode-se usar ao mesmo tempo d'outros meios therapeuticos, por ex, o alcatrão, a mistura de amidon e glicerina (1: 8). O doente faz á noite esta applicação e pela manhã lava-se e applica o involucro. (Schmidt's Jahrbuch, 1876, n. 1).

---