

RESENHA THERAPEUTICA

---

Tratamento local dos tumores chronicos do baço,— pelo Professor Mosler (*Deutsches Archiv f. klin. Med.* XV. 2. 1875). A splenotomia que é tão bem supportada pelos animaes tem sido já repetidas vezes feita no homem, e tem se visto que tanto a extirpação parcial do baço, de cuja operação são conhecidos já nove casos com resultado favorável, como tambem a extirpação total do baço, era bem supportada, quando feita em caso de ferimentos com prolapsio do baço. Pelo contrario, tiveram resultados muito desfavoraveis os casos de extirpação feita por causa de molestias internas; de 9 casos em que a operação foi feita, foram 6 seguidos de morte. Assim, ambos os doentes nos quaes Koeberlé e Bryaut fizeram a splenotomia por causa de leukemia splenica, succumbiram a hemorrhagias abundantes durante a operação ou immediatamente depois d'ella.

Além d'isto, está ainda em questão a indicação da operação, pela dificuldade do diagnostico, como mostra o caso de Péan que diagnosticou uma grande hydropsia do ovario esquerdo, e pelo contrario extirpou um kysto unilocular do baço.

Mosler recomenda para tratamento dos tumores chronicos do baço as injecções parenchymatosas, e communica um caso tratado por elle d'este modo.

Nos animaes Mosler muitas vezes injectou a tintura d'ido no baço puxado para fóra atravez d'uma ferida abdominal, sem haver peritonite consecutiva intensa; mas no homem escolheu elle a solução diluida de acido carbólico, e a solução de licor arsenical de Fowler.

Tratava-se d'un doente de 33 annos d'idade, que durante anno e meio sofreu d'uma intermitente de marcha irregular, e ha dous annos fóra prostrado por um typho abdominal e sofrera especialmente de edema em diferentes partes do corpo. O baço estava muito augmentado de volume. Desde então foi feita durante 16 dias, duas vezes por dia, uma injecção subcutanea de uma solução de 1

parte de chlorhydrato de quinina amorpho (Zimmer) em 5 partes d'água, depois das quaes eram applicadas sobre a parte bolsas com gêlo para prevenir os symptomas de inflamação local forte (sem esta precaução vio Mosler apparecerem ordinariamente, depois da injecção d'este preparado em individuos no estado typhico, abcessos graves e gangrena no lugar da applicação).

Com quanto se observasse logo uma diminuição manifesta do baço, Mosler para obter uma diminuição de volume ainda mais rápida, passou a injectar no próprio parenchyma do baço, e para executal-o, applicava previamente durante algumas horas uma bexiga de gêlo na região splenica, assim de que a contração da musculatura do baço diminuisse seu conteudo sanguineo, e então segurando o bordo anterior do baço e comprimindo a superficie do orgão contra a parede abdominal, introduzia uma seringa de Pravaz através da pelle no parenchyma do baço.

Injectou assim uma vez uma seringa inteira (cerca de 22 gôtlas) d'uma solução de 2 por cento d'acido carbolico, e um mez mais tarde, no mesmo doente, e repetidas vezes uma seringa, de cada vez, d'uma solução arsenical (1 parte de licor de Fowler para 10 d'água). Por causa da dôr que aparecia durante a injecção, especialmente na de acido carbolico, applicava Mosler imediatamente depois da injecção parenchymatosa uma injecção sub-cutanea de 0,02 grm. de morphina, e durante as 12 ou 24 horas seguintes uma bexiga de gêlo sobre a região splenica. D'este modo as injecções eram bem supportadas, a dor desapparecia dentro de 1 a 2 dias, e não se manifestava aumento da temperatura nem reacção outra desagradavel.

Mosler notou diminuição sensivel do baço depois das injecções parenchymatosas, e o estado geral do doente melhorou tambem.

Além das precauções já referidas, Mosler julga tambem conveniente o uso previo do sulphato de quinina durante algum tempo para diminuir a quantidade de sangue contida no baço; e tambem são operaveis somente os casos em que o baço pode ser exactamente comprimido contra a parede abdominal.

Com as injecções de solução de quinina receia elle violenta irritação do tecido.

Em relação á accão do arsenico lembra Mosler que Czerny tem empregado com bom resultado o licor de Fowler internamente e em

injecções parenchymatosas em lymphomas glandulares malignos. Assim foi conseguida em 7 meses a cura completa d'um doente que tornou internamente 746 gotas, e sofreu 76 injecções de 10 gotas cada uma. (Ochme. *Schmidt's Jahrbuech*, n. 5, 1876).

Tratamento da adenite syphilitica pelas injecções parenchymatosas de iodureto de potassio.—O *Practitioner* refere os resultados felizes obtidos pelo Dr. Jacubowitch, por meio d'este processo. Este medico não emprega nem a tinctura de iodo, nem liquido algum alcoolico, porem uma solução fraca de iodureto de potassio na proporção de um gramma para trinta.

Obteve um resultado completo em dois casos. No primeiro, em um bubão que tinha atingido o volume d'um ovo de pato, fez uma picada no vértice da glandula, introduzindo a agulha profundamente a uma distância consideravel. Depois de ter injectado o quarto do conteúdo da seringa, sentiu uma resistencia, retirou um pouco a canula, e depois repetindo muitas vezes esta manobra, chegou a injetar cerca de um gramma d'iodureto dissolvido em trinta grammos d'água.

O tumor a principio tornou-se mais duro, porém não tardou a diminuir de volume, e depois de quatro operações semelhantes, desapareceu completamente. Um bom resultado, foi igualmente obtido n'um outro caso de que se tratava d'um nucleo endurecido, persistente e tão duro que parecia que a injecção não poderia penetrar n'elle.

Esta operação é applicável a casos em que o endurecimento tenha resistido a qualquer outro tratamento e dado lugar a tumores persistentes que seja necessário fazer desapparecer. (*Journal de Médecine et de chirurgie pratiques*, Julho, 1876).

Injecção sub-cutanea d'ether no collapso por hemorrhagia grave. — A' Sociedade obstetricia de Dublin foi feita uma communicação muito interessante por A. V. Macau, acerca d'uma mulher a quem uma hemorrhagia puerperal tinha prostrado em estado de collapso profundo, e que foi reanimada graças as injecções sub-cutaneas de ether. N'esta mulher, em estado de morte imminente, elle injectou debaixo da pelle do abdomen duas seringas cheias ou cerca de 8 grammas.