

injecções parenchymatosas em lymphomas glandulares malignos. Assim foi conseguida em 7 mezes a cura completa d'um doente que tomou internamente 746 gotas, e soffreu 76 injecções de 10 gotas cada uma. (Ochme. *Schmidt's Jahrbuch*, n. 5, 1876).

Tratamento da adenite syphilitica pelas injecções parenchymatosas de iodureto de potassio.—O *Practitioner* refere os resultados felizes obtidos pelo Dr. Jacobowitch, por meio d'este processo. Este medico não emprega nem a tinctura de iodo, nem liquido algum alcoolico, porem uma solução fraca de iodureto de potassio na proporção de um gramma para trinta.

Obteve um resultado completo em dois casos. No primeiro, em um bubão que tinha attingido o volume d'um ovo de pato, fez uma picada no vertice da glandula, introduzindo a agulha profundamente a uma distancia consideravel. Depois de ter injectado o quarto do conteúdo da seringa, sentio uma resistencia, retirou um pouco a canula, e depois repelindo muitas vezes esta manobra, chegou a injectar cerca de um gramma d'iodureto dissolvido em trinta grammos d'agua.

O tumor a principio tornou-se mais duro, porém não tardou a diminuir de volume, e depois de quatro operações semelhantes, desapareceu completamente. Um bom resultado, foi igualmente obtido n'um outro caso de que se tratava d'um nucleo endurecido, persistente e tão duro que parecia que a injecção não poderia penetrar n'elle.

Esta operação é applicavel a casos em que o endurecimento tenha resistido a qualquer outro tratamento e dado lugar a tumores persistentes que seja necessario fazer desaparecer. (*Journal de Médecine et de chirurgie pratiques*, Julho, 1876).

Injecção sub-cutanea d'ether no collapso por hemorrhagia grave. — A Sociedade obstetricia de Dublin foi feita uma communicação muito interessante por A. V. Macan, acerca d'uma mulher a quem uma hemorrhagia puerperal tinha prostrado em estado de collapso profundo, e que foi reanimada graças as injecções sub-cutaneas de ether. N'esta mulher, em estado de morte imminente, elle injectou debaixo da pelle do abdomen duas seringas cheias ou cerca de 8 grammas.