

modo se promove a oxygenação do sangue, e ao mesmo tempo desvia-se a congestão do cerebro, abrindo ao sangue uma via nova.

(Sickel. *Schmidt's Jahrbuch* 1876, n. 4.)

Reposição do utero gravido em retroflexão, por meio da posição da doente e da pressão atmosphérica—Numa das sessões da *New-York Obstetrical Society* em Fevereiro do corrente anno, o Dr. Paul Mundé, cirurgião do *New-York State Woman's Hospital* referiu sobre este assumpto um caso interessante, que forneceu-lhe inesperadamente um meio therapeutico facil e excellento contra estas affecções do utero.

Uma mulher de 28 annos, mãe de duas creanças, procurou-o queixando-se de grande pezo na bacia e nos quadris, que se tornava as vezes n'uma dôr insupportavel, sobretudo depois de caminhar ou permanecer em pé por muito tempo; constipação de ventre, dysuria, com desejos de urinar frequentes e acompanhados de tenesmos. O exame vaginal mostrava o utero n'um estado de retroflexão aguda, o corpo e o fundo occupando a cavidade do sacro, e comprimindo firmemente o recto, e o collo situado abaixo da symphyse do pubis. Abaixo do fundo estava o ovario esquerdo engorgitado e muito sensivel. Pelo tamanho do utero e pelo toque do corpo verificou o Dr. Mundé uma prenhez de cerca de 10 semanas. A sensibilidade do orgão á pressão mostrava a necessidade de prompta interferencia e reposição do utero deslocado, tanto mais quanto em dous abortos que soffrera já esta doente na 10^a e 12^a semana, a reposição do utero e a applicação d'um pessario, depois de começada a hemorragia, foram inuteis.

O Dr. Mundé tentou a reposição fazendo collocar-se a doente sobre os joelhos e cotovellos, *à la vache*, e com os dedos da mão direita impellindo o fundo do utero, ora pelo *cul de sac* posterior da vagina, ora com os dedos introduzidos pelo recto.

Apezar de todo o esforço foi impossivel deslocar o fundo do utero.

No dia seguinte, depois de esvasiado o recto e a bexiga, fez nova tentativa para impellir, com os dous dedos introduzidos no recto, o fundo do utero da cavidade do sacro para cima do promontorio, puxando ao mesmo tempo o collo do pubis para o pavimento da bacia.

Tudo foi inutil.

O Dr. Mundé introduziu então o speculum de Sims, continuando a doente na mesma posição, *à la vache*, e com o speculum levantou fortemente o perineo, com o fim de fixar o collo com um tenaculo duplo, quando de repente vio que a vagina estava distendida pelo ar como um balão, no meio do qual apparecia o collo do utero.

Olhando para o corpo do utero vio com surpresa que elle tinha desaparecido, que a excavação do sacro estava vazia, e que a obstinada retroflexão do utero gravido tinha se reduzido espontaneamente e sem dôr.

A doente mostrou-se logo alliviada dos symptomas que a opprimiam, e o Dr. Mundé applicou-lhe logo um pessario de Albert Smith do qual a doente usou depois satisfactoriamente.

A explicação do facto é simples e identica ao mechanismo da acção do speculum de Sims nos exames e operações do utero e da vagina. A posição da doente faz escorregarem da bacia sobre a parede anterior do abdomen as visceras abdominaes moveis, diminue portanto a pressão intra-abdominal sobre o fundo da bacia e exerce demais como uma sucção ou tracção sobre os órgãos pelvianos. A elevação forçada do perinêo abrindo a entrada da vagina, dá ingresso a grande porção de ar, cuja pressão distende a bolsa vaginal, e concorre com a tracção intra-abdominal para repor o utero.

Pelo mesmo modo obteve Solger (*Beitrag zur Geburtshilfe und Gynœkologie*, vol 4º n. 1) a reposição d'um utero gravido em retroflexão, que em vão tentára reduzir pelos dedos, pelo colpeurynter, etc. (*The American Journal of Obstetrics* Junho, 1876.)

Hydrometria simulando gravidez; abertura espontanea do kysto; cura.—O Dr. Felicio dos Santos refere sob este titulo na *Revista Medica do Rio de Janeiro* um caso assaz interessante quer pela marcha, quer pela terminação.

Uma senhora de 35 annos, forte porém hysterica, casada ha muitos annos, e sem filhos, com um individuo de mais de 50, decadente e mal constituido, consultou-o por causa d'uma leucorrhœa serosa com suppressão de menstruos de 2 a 3 mezes. Alguns mezes depois cessou a leucorrhœa e começou a crescer-lhe o ventre, chegando a senhora a suppor-se grávida, e até a sentir os movimentos do fêto. Vio-a então de novo o Dr. Felicio dos Santos; o ventre parecia ter