

morte seria possível verificar-se? A offensa de um nervo porém só nos escapará, quando a autopsia não a patentear, como (entre outros muitos) nos casos de Magendie e Richet, citados pelo Dr. L. Lefort 1; —o de Barrier e Chassaignac, em que, diz este autor, não se pôde affirmar, que, não fosse a aphonía devida a uma contusão do pneumo-gástrico durante o despimento da arteria, apesar da habilidade bem conhecida dos operadores. Assim também o doente de Ewing, que no quarto dia morreo de tosse acompanhada de producção de grande quantidade de muco difficilmente expectorado;—o de Costes, que falleceo muito mais tarde;—o de Machachlan, que succumbio no quarto dia com accessos de oppressão;—e os de Duncan e de Fergusson, que morreram com accessos de suffocação, o primeiro no 13.º dia, e o segundo no primeiro dia.

No caso, que publicamos, e que todas as circumstancias concorrem a tornar interessante e instructivo, uma hemorrhagia consecutiva determinaria provavelmente a morte, se a offensa do pneumo-gástrico não a tivesse antecipado.

CATARRHO NASO-PHARINGÊO, OBSTRUÇÃO DA TROMPA D'EUSTACHIO, INSUFFLAÇÃO DE AR E DE VAPORES D'ÍODO, INJECCÕES HYPODERMICAS DE STRYCHNINA; CURA.

Pelo Dr. A. Pacifico Pereira

A Sra. G. de cerca de 24 annos, temperamento lymphatico, constituição fraca, soffria com frequencia de catarrho naso-pharyngêo, e ha cerca de quatro annos fôra d'elle fortemente atacada durante alguns dias, e depois d'esta epoca sentira enfraqucer-lhe a audição do ouvido direito a ponto de tornar-se quasi nulla.

Ha alguns mezes o ouvido esquerdo começou também a ressentir-se, e a surdez era quasi completa, quando fui chamado em Abril para tratá-la.

Examinando com o speculum da orelha, via-se no lado direito a membrana do tympano muito concava na face externa e o cabo do martello muito proeminente.

Praticando o catheterismo da trompa de Eustachio e a insufflação de ar na orelha media, percebia com o otoscópio que o ruído produzido pelo ar na orelha media e contra a membrana do tympano era secco e fraco do lado direito; mas forte e precedido d'uma crepitação humida do lado esquerdo.

Pelo rhinoscópico viam-se na mucosa do pharynge e da parte posterior das fossas nasaes os symptomas do catarrho chronico com turgencia e granulações da mucosa.

Comecei o tratamento pela insufflação de ar na orelha media, de ambos os lados, por meio do catheterismo das trompas; julgando porém conveniente para desembaraçal-as completamente, e restabelecer a entrada facil do ar na caixa do tympano, insufflar o ar todos os dias, preferi empregar o processo de Politzer, que tem a grande vantagem de dispensar o catheterismo da trompa, e que o doente depois de aprender algumas vezes, pode fazer por si mesmo. ¹

Ao mesmo tempo, com o aparelho de Lewiu applicava em inhações uma solução fraca de iodo e iodureto de potassio (iodo puro 0,15 centigrammas, iodureto de potassio 0,30 centigrammas, agua distillada—60 grammas).

Durante cerca de dez dias foi applicado este tratamento, e com elle desappareceram quasi completamente os symptomas do catarrho da trompa; mas tendo melhorado pouco a audiçáo comecei a fazer injeções hypodermicas de strychnina na região mastoidéa, visto que a surdez já não me parecia devida a embaraço ao accesso do ar

¹ O methodo de Politzer consiste em insufflar o ar no espaço naso-pharyngéo emquanto o doente faz movimentos de deglutição, d'este modo: introduz-se uma canula recta ou ligeiramente recurvada, cerca de meia pollegada, na porção anterior de uma das fossas nasaes, fecham-se completamente as ventas apertando brandamente com os dedos as alas do nariz sobre a canula introduzida, e n'esta insuffla-se o ar por meio d'um pequeno balão de gomma elastica, emquanto o doente, exactamente no mesmo momento faz movimentos de deglutição.

No momento da deglutição o véo do paladar divide completamente a cavidade posterior das fossas nasaes da porção inferior do pharynge, e ao mesmo tempo se abre a porção cartilaginosa da trompa d'Eustachio, por effeito da contracção do musculo peristaphylinno; o ar insufflado entre portanto pela trompa para a orelha mediu.

na orelha media, pois a trompa era manifestamente pervia; mas parecia depender do enfraquecimento da innervação do aparelho auditivo, consecutivo á abolição temporaria de sua funcção.

Fiz duas vezes por semana, durante um mez, injeções hypodermicas de strychnina, na região mastoidéa direita e na esquerda, alternadamente, começando por um milligramma e elevando gradualmente a 0,0025 em cada injeção.¹

A audição foi se restabelecendo pouco a pouco muito sensivelmente. No fim de seis semanas de tratamento a doente o restabelecimento era quasi completo. Hoje a audição é perfeita pelo ouvido esquerdo e muito satisfactoria pelo direito.

PATHOLOGIA INTERTROPICAL

COLICA SECCA DOS PAIZES QUENTES

(Continuação da pagina 403)

Na sessão de 23 de Maio fez o Sr. Mialhe algumas interessantes considerações, não sobre a questão da colica secca, e de sua origem saturnina ou outra, mas sobre a pequena quantidade de chumbo que basta para produzir a colica dos pintores, comtanto que a introduccão na economia de qualquer preparado d'aquelle metal, embora em dóse minima, seja *continuada por muito tempo*. Entre mil exemplos d'esta verdade cita um referido por Duchêne (de Boulogne); era uma operaria com paralytia saturnina por occupar-se todo o dia a embrulhar pacotes de chá em laminas de chumbo, não tendo em contacto com este metal senão a palma das mãos e a polpa dos dedos.

A respeito da opinião contraria do Sr. Ruzf de Lavison, de não serem sufficientes a bordo dos navios as latas de conserva e os tubos

¹ A formula empregada foi a seguinte: sulphato de strychnin 6 centigrammos, agua distillada 10 grammos.

Dois decigrammas d'esta solução contém um milligramma de sulphato de strychnina.