

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

=

CIRURGIA

Cystotomia super-pubiana por incisão da parede anterior da bexiga sobre o calculo.—O Dr. A. Amussat publicou no *Courrier Médical* um caso, de condições especiaes, em que praticou este processo com excellento resultado.


Era uma creança de 4 a 5 annos em quem o Dr. Amussat verificou a existencia de um calculo muito volumoso. Decidio-se a fazer a cystotomia superpubiana. Depois de chloroformizado o doente, injectou agua na bexiga para distendel-a sufficientemente, praticou uma incisão de cerca de 5 centimetros a partir do pubis, comprehendendo os tecidos até a linha alva, n'esta fez uma pequena abertura perto do pubis, pela qual prolongou a incisão com um bistouri herniario, na extensão de 4 centimetros. Introduzindo um lithoclasta de creança pela urethra, ponde com elle segurar o calculo, que, levantando-se o instrumento, fazia salienciã pela extremidade superior um centimetro abaixo do umbigo.

Desalojando-o da cavidade em que estava preso, o Dr. Amussat levou-o no lithoclastata para a parede anterior da bexiga, correspondendo à incisão abdominal. Um ajudante sustentou-o n'esta posição, e o operador fez na bexiga uma incisão de mais de dous centimetros, sem atacar o peritonêo, pela qual penetrou o dedo, e retirado o lithoclasta, procurou com o dedo levar o calculo pela extremidade inferior para a abertura da bexiga, e com uma pequena tenaz conseguiu extrahil-o.

Para collocar a canula elastica afim de dar esgoto á urina para fora, o Dr. Amussat com o fim de evitar nova introduccão do dedo, que se expõe a romper o tecido cellular para-vesical, favorecendo o derrame da urina e a formação dos abscessos, introduzio pela urethra uma sonda metallica de creança, de grande curvadura, fez sahir a ponta na abertura abdominal, e por ella fez penetrar como bainha uma sonda elastica aberta nas duas extremidades. Retirada a sonda

metallica, foi reunida a ferida por quatro pontos de sutura entortilhada, a sonda elastica fixada por meio d'um fio no alfinete mais proximo, e com a extremidade livre n'um vaso de vidro para receber a urina.

No fim de 22 dias a cura era completa.



O calculo extrahido era de cor esbranquiçada, com um nucleo escuro e muito duro. Pezava 45 grammas, tinhá 2 e $\frac{1}{2}$ centimetros de espessura, e segundo o Sr. Mayet era formado de urato d'ammoniaco.

Aneurisma da carotida primitiva esquerda, curado pela applicação da electricidade sobre a superficie externa do tumor.— Na *Revista Medica do Rio de Janeiro* refere o Dr. J. Pereira Guimarães, distincto cirurgião d'aquella cidade, um caso em que obteve excellento resultado pela applicação d'este meio que lhe suggerio a necessidade.

O tumor se estendia até abaixo da clavícula, era portanto impossivel a ligadura e contra-indicado o emprego de injecções coagulantes. O auctor hesitando no emprego da electro-punctura, lembrou-se de applicar a electricidade sobre a superficie externa do tumor como um meio de provocar a coagulação do sangue.

O auctor não declara qual a machina electrica empregada, diz porém que era de força semelhante à electro-magnetica de Gaille, que os electros eram dados com a força ordinaria para os casos de paralyisa muscular, collocando alternativamente os dous electros,