


metallica, foi reunida a ferida por quatro pontos de sutura entortilhada, a sonda elastica fixada por meio d'um fio no alfinete mais proximo, e com a extremidade livre n'um vaso de vidro para receber a urina.

No fim de 22 dias a cura era completa.



O calculo extrahido era de cor esbranquiçada, com um nucleo escuro e muito duro. Pezava 45 grammas, tinhá 2 e $\frac{1}{2}$ centimetros de espessura, e segundo o Sr. Mayet era formado de urato d'ammoniac.

Aneurisma da carotida primitiva esquerda, curado pela applicação da electricidade sobre a superficie externa do tumor.— Na *Revista Medica do Rio de Janeiro* refere o Dr. J. Pereira Guimarães, distincto cirurgião d'aquella cidade, um caso em que obteve excellento resultado pela applicação d'este meio que lhe suggerio a necessidade.

O tumor se estendia até abaixo da clavícula, era portanto impossivel a ligadura e contra-indicado o emprego de injeções coagulantes. O auctor hesitando no emprego da electro-punctura, lembrou-se de applicar a electricidade sobre a superficie externa do tumor como um meio de provocar a coagulação do sangue.

O auctor não declara qual a machina electrica empregada, diz porém que era de força semelhante à electro-magnetica de Gaille, que os electros eram dados com a força ordinaria para os casos de paralyisa muscular, collocando alternativamente os dous electros,

pósitivo e negativo, sobre diversos pontos do tumor, ora approximando-os, ora afastando-os.

A applicação durava dous minutos, e era interrompida por momentos, por causar bastantes dores.

Depois de quatro sessões, com intervallos de 2 a 3 dias, o tumor diminuiu muito, e tornou-se mais duro; apresentaram-se porém symptomas inflammatorios locais, que determinaram a applicação do gelo. Mais duas sessões tiveram lugar ainda, e dez dias depois da ultima o tumor estava reduzido a dous terços do volume, muito mais duro e pulsando lentamente.

N'este estado sahio o doente do hospital por exigir alta. Dous mezés depois foi visto pelo Dr. Pereira Guimarães. O tumor estava já completamente endurecido, sem o menor batimento, e reduzido a quasi metade do volume; e foi diminuindo cada vez mais a ponto de reduzir-se, cerca de um anno depois, a um nucleo duro, achatado, e do volume d'uma pequena moeda de nickel.

O doente foi apresentado pelo Sr. Dr. Guimarães á Academia Imperial de Medicina. ¹

Tratamento das ulceras da perna pela compressão elastica intermittente.—Turney, de Circleville (Ohio) recommenda um novo meio de tratamento das ulceras atonicas da perna. applica sobre o membro doente de modo intermittente, a banda elastica que se emprega no apparelho de Esmarcha. Cita para exemplo o caso d'uma mulher de 85 annos que tinha acima do malleolo interno uma ulcera, que tinha resistido a todos os tratamentos durante 15 annos. Era quasi circular, de cinco centimetros de diametro e bordos endurecidos. Em torno a pelle era espessa e corada em vermelho, com erupção eczematosa.

¹ N'este caso interessantissimo o resultado brilhante obtido pelo distincto cirurgião foi, creio, devido á inflammção da parede do sacco produzida pela accção directa da electricidade. A physiologia e a clinica mostram evidentemente a influencia do processo inflammatorio da tunica interna do vaso, sobre a coagulação do sangue, e o maior numero das applicções da therapeutica cirurgica dos aneurismas, com excepção da ligadura, não obram, senão por meio da inflammção que provocam. N'um caso de aneurisma da pediosa, a que assisti com meus illustres collegas os Srs. Drs. Almeida Couto e Caldas, a injección sub-cutanea de ergotina como recommenda Langenbeck, foi seguida de cura, depois de uma inflammção erysipelatosa do pé.

Qualquer que seja o mechanismo da cura, a applicação feita pelo Dr. Pereira Guimarães foi coroada de tão feliz resultado, que deve ser praticada em mais larga escala.