

positivo e negativo, sobre diversos pontos do tumor, ora approximando-os, ora afastando-os.

A applicação durava dous minutos, e era interrompida por momentos, por causar bastantes dores.

Depois de quatro sessões, com intervallos de 2 a 3 dias, o tumor diminuiu muito, e tornou-se mais duro; apresentaram-se porém symptomas inflamatorios locaes, que determinaram a applicação do gêlo. Mais duas sessões tiveram lugar ainda, e dez dias depois da ultima o tumor estava reduzido a dous terços do volume, muito mais duro e pulsando lentamente.

Neste estado sahio o doente do hospital por exigir alta. Dous mezes depois foi visto pelo Dr. Pereira Guimarães. O tumor estava já completamente endurecido, sem o menor batimento, e reduzido a quasi metade do volume; e foi diminuindo cada vez mais a ponto de reduzir-se, cerca de um anno depois, a um nucleo duro, achatado, e do volume d'uma pequena moeda de nickel.

O doente foi apresentado pelo Sr. Dr. Guimarães á Academia Imperial de Medicina.<sup>1</sup>

**Tratamento das ulceraas da perna pela compressão elástica intermitente.**—Turney, de Circleville (Ohio) recommends um novo meio de tratamento das ulceraas atónicas da perna. Applica sobre o membro doente dc modo intermitente, a banda elástica que se emprega no apparelho de Es-marcha. Cita para exemplo o caso d'uma mulher de 85 annos que tinha acima do malleolo interno uma ulcera, que tinha resistido a todos os tratamentos durante 15 annos. Era quasi circular, de cinco centimetros de diametro e bordos endurecidos. Em torno a pelle era espessa e corada em vermelho, com erupção eczematosa.

<sup>1</sup> N'este caso interessantíssimo o resultado brilhante obtido pelo distinto cirurgião foi, creio, devido à inflamação da parede do sacco produzida pela accão directa da electricidade. A physiologia e a clínica mostram evidentemente a influencia do processo inflamatorio da tunica interna do vaso, sobre a coagulação do sangue, e o maior numero das applicações da therapeutica cirúrgica dos aneurismas, com excepção da ligadura, não obram, senão por meio da inflamação que provocaem. N'un caso de aneurisma da pediosa, a que assisti com meus illustres collegas os Srs. Drs. Almeida Couto e Caldas, a injeccão sub-cutânea de ergotina como recomenda Langenbeck, foi seguida de cura, depois de uma inflamação erysipelatoso do pé.

Qualquer que seja o mecanismo da cura, a applicação feita pelo Dr. Pereira Guimaraes foi coroada de tão feliz resultado, que deve ser praticada em mais larga escala.

A atadura elástica foi applicada com força, cada dia uma vez, desde o pé até o joelho, ahí deixada tanto quanto pudesse ser supportada, isto é, cerca de dez a quinze minutos.

Consistio n'isto todo o tratamento, porque esta mulher, activa, não obstante a edade, proseguio em suas occupações ordinarias. Rapidamente produzio-se uma melhora, e em menos de quatro semanas estava terminada a cicatrisação.

Ha mais de dous annos que passou-se isto, e a cicatriz ainda bem solidia, tem resistido a um eczema gráve.

Seis outros casos deram igualmente bom resultado.

A compressão tem sido empregada muitas vezes n'estes casos, porém ha n'este processo alguma coursa mais, e as pressões alteradas trazem alternativas d'anemia e d'hyperemia que parece terem um papel importante na producção dos phenomenos de reparação.

Em todo o caso trata-se d'un processo, de applicação facil e pouco perigoso, que merece ser ensaiado.

(*Practitioner e Journal de Med. e Chir. Pratiques Julho, 1876.*)

*Hernia volumosa estrangulada, reduzida pelo processo americano.*—O Dr. Bonnemaison conta a *Gazette medico-chirurgicale de Toulouse* (maio, 1876) um caso de hernia estrangulada, em que o taxis muitas vezes repetido tinha falhado, e o doente se recusava absolutamente à operação.

A hernia muito volumosa, media, no momento do estrangulamento, 31 centimetros de comprimento sobre 40 de circunferencia na parte media; era inguino-escrotal direita. O doente, de 43 annos de idade, tinha esta hernia desde a infancia, mas nunca quiz contel-a com una funda. Somente ha uns dez annos tinha tomado um desenvolvimento consideravel, mas se conservava completa e facilmente reductivel. O estrangulamento se produzio em consequencia de excessos de bebedas, e resistio a muitas tentativas de taxis feitas tanto pelo doente mesmo, como pelo medico.

Na tarde do terceiro dia, recusando-se sempre o doente á operação, o Sr. Bonnemaison pozi em practica o processo americano do Dr. Leasure: um ajudante collocado ao pé do leito levantou sobre as espaldas as pernas do doente. D'este modo ficava o doente tocando no leito somente pela cabeça e pelas espaldas, e as paredes abdo-