

A atadura elástica foi applicada com força, cada dia uma vez, desde o pé até o joelho, ahí deixada tanto quanto pudesse ser supportada, isto é, cerca de dez a quinze minutos.

Consistio n'isto todo o tratamento, porque esta mulher, activa, não obstante a edade, proseguio em suas occupações ordinarias. Rapidamente produzio-se uma melhora, e em menos de quatro semanas estava terminada a cicatrisação.

Ha mais de dous annos que passou-se isto, e a cicatriz ainda bem solidia, tem resistido a um eczema gráve.

Seis outros casos deram igualmente bom resultado.

A compressão tem sido empregada muitas vezes n'estes casos, porém ha n'este processo alguma coursa mais, e as pressões alteradas trazem alternativas d'anemia e d'hyperemia que parece terem um papel importante na producção dos phenomenos de reparação.

Em todo o caso trata-se d'un processo, de applicação facil e pouco perigoso, que merece ser ensaiado.

(*Practitioner e Journal de Med. e Chir. Pratiques Julho, 1876.*)

Hernia volumosa estrangulada, reduzida pelo processo americano.—O Dr. Bonnemaison conta a *Gazette medico-chirurgicale de Toulouse* (maio, 1876) um caso de hernia estrangulada, em que o taxis muitas vezes repetido tinha falhado, e o doente se recusava absolutamente à operação.

A hernia muito volumosa, media, no momento do estrangulamento, 31 centimetros de comprimento sobre 40 de circunferencia na parte media; era inguino-escrotal direita. O doente, de 43 annos de idade, tinha esta hernia desde a infancia, mas nunca quiz contel-a com una funda. Somente ha uns dez annos tinha tomado um desenvolvimento consideravel, mas se conservava completa e facilmente reductivel. O estrangulamento se produzio em consequencia de excessos de bebedas, e resistio a muitas tentativas de taxis feitas tanto pelo doente mesmo, como pelo medico.

Na tarde do terceiro dia, recusando-se sempre o doente á operação, o Sr. Bonnemaison pozi em practica o processo americano do Dr. Leasure: um ajudante collocado ao pé do leito levantou sobre as espaldas as pernas do doente. D'este modo ficava o doente tocando no leito somente pela cabeça e pelas espaldas, e as paredes abdo-

minas ficavam no estado de relaxamento, o mais completo possível pela flexão forçada da columna vertebral. Um taxis moderado, prolongado por dous ou tres minutos bastou n'estas condições para produzir a redução completa. Por este processo já tem obtido alguns resultados felizes o Dr. Perier.

(*Gazette Médicale de Paris*, 19 de Agosto de 1876.)

NOTICIARIO

Itaparica, refugio para beribericos.—A notoria saluhridade de muitos lugares da ilha de Itaparica induziu a alguns médicos d'esta cidade a mandarem para lá aquelles dos seus doentes de beriberi, que não podiam, ou não queriam viajar para fóra dos tropicos.

Apezar de terem alguns casos de observação propria em favor da excellencia do clima d'aquelle ilha para as pessoas affectadas d'esta formidavel molestia, quizeram dous dos nossos collegas de redacção, os Drs. Silva Lima, e Pacifico Pereira verificar pessoalmente até que ponto era justificada a fama dos bons resultados obtidos por muitos outros enfermos, e dirigiram-se à villa do mesmo nome, para onde affluem os beribericos em maior numero ha algum tempo a esta parte.

A visita realizou-se nos dias 12 e 13 do corrente.

As informações que nos dão os nossos collegas são, em resumo, as seguintes:

A villa assenta em uma planicie na ponta NO da ilha.

O terreno da planicie e das collinas proximas é, em geral, arenoso e enxuto.

A agua potavel é excellente e muito abundante.

Há uma espaçosa e commoda praia de bânhos.

Os ventos reinantes ordinarios, são, pela manhã os do quadrante do N., e á tarde os de E.