

170—180.....	71,9
180—190.....	72,5
190—200.....	73,4
acima de 200.....	71,2

(Archiv. f. Gynekologie, 9^{ter} Bd. 3^{tes} Heft, 1876).

Operação cesarea post-mortem com extracção d'uma creança viva 2 horas depois da morte da mãe.—O Dr. P. A. Verouden referio à *Philadelphia Obstetrical Society* o seguinte caso:

Uma mulher de nome M. Peters, moradora em Ulfz, de trinta e cinco annos de idade, com alguns filhos, soffria de phthisica pulmonar, já em estado muito grave, e achava-se no sexto mez da prenhez. Inesperadamente succumbio poucos dias depois a uma hemoptyse. Chegando duas horas depois da morte da mulher, o Dr. Verouden percebeu ainda distinctamente com o sthetoscopia as pancadas do coração do fêto, e praticou em seguida a operação cesarea pela secção abdominal, tirando um fêto vivo, que não tinha ainda seis mezes, mas viveo algumas horas, e recebeu o baptismo na igreja. (*American Journal of Obstetrics*, Agosto 1876.)

Hematocèle retro-uterina.—No volume 16^o das *Obstetrical Transactions* vem publicado um caso observado pelo Dr. W. R. Rogers, muito interessante para o estudo da pathologia d'esta affecção, quer pela difficuldade do diagnostico, quer pela terminação e pela origem obscura das alterações verificadas pela autopsia.

«Uma mulher anemica, mãe d'uma creança de 7 annos, entrou a 17 de Junho no *Samaritan Hospital*.

Soffria ha um anno, periodicamente, e sobretudo nas epochas catameniaes, dôres no abdomen.

Ha cerca de 7 semanas começou a sentir um tumor no ventre, que julgava existir já ha mais tempo, porque já de alguns mezes percebia crescer-lhe o ventre. A idéa de gravidez parecia excluida porque a menstruação era regular e abundante.

O tumor enchia a bacia incompletamente do lado esquerdo, foi considerado um fibroide do utero, e immediatamente applicada a laminaria para dilatar o collo do utero. Sentia-se a parede posterior