

injecção n. 2 faz-se duas vezes, com dez dias d'intervallo, e é quasi tão temível como a primeira. A injecção n. 3 se repete 3 vezes com o mesmo intervallo, e o ponto em que se faz, permanece duro e doloroso durante alguns dias.

O professor Bamberger, tambem de Vienna, recommenda a seguinte solução para injecções hypodermicas:

Tome-se: clara d'ovo—trinta centimetros cubicos; agua distillada—45 centimetros cubicos.

Bata-se e filtre-se; deve resultar um liquido albuminoso, quasi limpido, ligeiramente opalino.

D'outro lado dissolva-se:

Sublimado corrosivo.....	1 gramma
Agua distillada.....	19 grammas

Ajunte-se a esta solução, mechendo-a, sem parar, o liquido albuminoso, até que algumas gottas da mistura, com a addição d'uma solução de carbonato de soda não deem mais a cor amarella.

Ajunte-se depois uma solução de

Chlorureto de sodio.....	1 gramma
Agua distillada.....	16 grammas

até que o precipitado que se forma, se dissolva de novo; complete-se com agua distillada q. s. para formar 100 centimetros cubicos; deixe-se em repouso dois dias e finalmente filtre-se.

A solução deve ser limpida; a cada centimetro cubico corresponde 0,01 gramma de bi-chlorureto de mercurio em estado de albuminato dissolvido em uma solução de chlorureto de sodio. (*El Siglo Medico* Setembro e Outubro de 1876).

O jaborandi como galactagogo.—O Dr. R. S. Peart recommenda esta substancia como um excellente galactagogo, e muito mais seguro do que as applicações topicas, p. ex. o unguento da fava de calabar elogiado pelo Dr. Monro, cuja accão pode ser prejudicial á creança quando por esquecimento ou descuido se ponham os labios d'ella, em contacto com o seio em que a unccão tenha sido feita.

O jaborandi tomado na dose de cinco grãos do pó, em infusão, tres vezes por dia, tem uma accão muito decidida no augmento da se-

creção do leite, nos casos em que o fluxo é muito pouco abundante, e as mães não podem portanto amamentar as crianças.

Se os seios não estão bem desenvolvidos, e não se prestam propriamente à função secretora, é necessário continuar com o medicamento por algum tempo, pois a secreção provavelmente diminuirá se suspender-se logo o uso do jaborandi.

O leite que resulta d'esta medicação convém perfeitamente à criança, pois o jaborandi não tem nenhuma ação desfavorável sobre sua qualidade.

A propriedade galactagoga do jaborandi foi já indicada pelo Dr. Ringer e outros, que mencionaram sua ação sobre o aumento das secreções da pelle, e das glandulas salivares e mamarias.

E' inutil dizer que convém ao mesmo tempo uma dieta reparadora, afim de fornecer em abundancia os elementos necessarios à formação do leite. (*The British Medical Journal*, Novembro 18, 1876.)

VARIEDADE -

DISCURSO DO DIRECTOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA, CONSELHEIRO DR. ANTONIO JANUARIO DE FARIA NO ACTO DA COLLAÇÃO DO GRAO.

Senhores—Ha phrases que envolvem uma prophecia.

Ha momentos que assignalam uma epocha.

Neste dia solemne, nesta festa do espirito, d'esse grande revolucionario que transforma o homem na terra e lhe crea a primeira das jerarchias, a jerarchia do pensamento, vão abrir-se ante vós as portas da grande arena do mundo; a magia dos vossos sonhos, o fervor de vossos desejos e o esplendido irradiar de vossa esperança, d'essa planta que viceja até nas cercanias da morte, convertem-se hoje em grata realidade.

A phrase solemne que, de joelhos e com a mão sobre o grande livro das verdades eternas, ha pouco proferistes, vaticina-vos um futuro brillante e esplendoroso de gloria.