

Metzquer é um dos mais obstinados adversarios do Sr. Villemain, e n'estes ultimos tempos trouxe ainda á academia uma nova serie de experiencias de muito valor, que são inteiramente contrarias á doutrina da inoculabilidade do tubereulo.

Recentemente se deu um facto importante: a sociedade de anthropologia se transformou em corporações docente, e estabeleceu suas cadeiras na escola de Medicina de Paris. A anthropologia é representada alli por Broca, Mortillet, Lagneau, e Bertillon, brilhante pleiade que tomou a iniciativa da sciencia do homem.

Organisou-se assim um corpo docente completo, que é o mais bello exemplo do ensino privado vindo reunir-se ao ensino publico. Enquanto a sciencia organisa seus meios de investigação e de progresso, as molestias continuam sua marcha aggressiva e suas contra-marchas offensivas. Assim a febre typhoide cobrio a França inteira com uma epidemia immensa que se estendeu successivamente do campo ás cidades, e d'uma cidade a outra, sem esquecer a capital que foi atacada em ultimo lugar, e que da mesma sorte que os grandes centros foi particularmente maltratada.

A febre typhoide foi, pois, o assumpto na ordem do dia das discussões das sociedades de medicina, e da academia mesma.

N'uma proxima carta passarei em revista o primeiro trimestre do anno que corre, e tratarei de todos os assumptos que possam interessar aos leitores da *Gazeta Medica*.

24 de Março de 1877.

Dr. Henri Almé.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

MEDICINA

A diabetes e o salicylato de soda.—Encontramos no *Med. Times & Gazette* a seguinte nota sobre a influencia do salicylato de soda na diabetes assucarada.

O Dr. Muller-Warneke, medico ajudante na clinica do professor

Bartels, em Kiel (*Berliner Klin. Wochenschrift*, 1877, ns. 3 e 4) resume os resultados de uma observação cuidadosa e prolongada de dous casos de diabetes, que foram tratados com este preparado, pelo modo seguinte: 1.º O salicylato de soda pode supprimir completamente os symptomas da diabetes assucarada, bem que a sua acção nem sempre se mostre permanente. 2.º Os symptomas da diabetes desaparecem tanto mais rapidamente quanto maior a dose administrada, e por mais tempo continuada em qualquer caso particular. 3.º Em doses diarias moderadas (9 a 10 grammas por dia) a influencia inicial do salicylato sobre o processo diabetico parece esgotar-se gradualmente, ao passo que grandes doses (14 a 16 grammas) exercem crescente e poderoso effeito sobre elle. 4.º O salicylato de soda pode ser administrado em grandes doses diarias na diabetes chronica por longo espaço de tempo sem nenhuma perturbação especial da saude geral; e no caso de apparecerem quaesquer symptomas de envenenamento, estes desvanecem-se rapida e completamente, supprimido o remedio por algum tempo. 5.º O salicylato de soda parece apenas ter um effeito ligeiramente irritante sobre os rins na diabetes, mesmo depois do seu uso prolongado.

Quem primeiro chamou a attenção sobre o salicylato de soda na diabetes foi o professor Ebstein, de Gottingue, em 1876, no mesmo citado periodico allemão (n. 24). Nos seus casos o salicylato em doses de 5 a 10 grammas por dia produziu consideravel diminuição, e ás vezes até desaparecimento do assucar da urina; e elle observou que doses ainda menores sustentavam os bons effeitos das que a principio eram mais avultadas.

Variações da uréa nas molestias do fígado.—O Dr. M. P. Brouandel publicou nos *Archives de Physiologie* (Julho de 1876) uma interessante memoria sobre as variações da uréa nas molestias do fígado. Este trabalho termina no numero de Setembro do mesmo jornal.

As conclusões do autor são as seguintes: 1.º Na atrophía amarella aguda a uréa diminue, ou desaparece completamente. 2.º No envenenamento pelo phosphoro, embora cada dose d'esta substancia produza um accrescimento temporario na quantidade da uréa excretada, esta gradualmente diminue. 3.º Em alguns casos pseudo-malignos