

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

GIRURGIA, OPHTALMOLOGIA E OTOLOGIA.

Deformação na fractura do radio.—Em uma das suas conferencias clinicas observa o Sr. Trélat, a proposito de um caso de fractura do radio, que esta não se accompanha constantemente da deformação classicamente conhecida pelo nome de *dorso de garfo*. O facto tem sua razão, segundo elle na idade do doente, e pode ser explicado do seguinte modo:

Nos individuos de maior idade, assim como nos velhos, dá-se aquella fractura exactamente na extremidade do osso, se accompanhando quasi sempre de dilaceração com penetração mais ou menos pronunciada dos fragmentos. Pode em tal caso ser pouco apreciavel o deslocamento e portanto a deformação. Nos individuos moços, pelo contrario, é o collo do radio, no ponto de junção da epiphyse e da diaphyse, o affectado, e a fractura situada muito mais para cima do que no caso precedente.

O fragmento pode, então, produzir movimentos mais extensos, e, deslocando-se, determinar a deformação alludida. E' isso, como se vê, uma differença, na clinica e no diagnostico importante para o exame da fractura do radio nos individuos moços ou idosos.

(Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques, Abril, 1877.)

Cauterisação na fistula anal.—No *Hôpital des Cliniques*, chamou o Sr. Broca a attenção sobre as vantagens do fio galvano-caustico, do thermo-cauterio e, em geral, do cauterio actual, para as operações indicadas por abcessos ou fistulas do anus.

Insiste, sobretudo, em que não tendendo a ferida pelo cauterio á reunião, torna-se dispensavel no curativo a mecha, que é quasi sempre causa de dor, de inflammação e mesmo das hemorragias, que tantas vezes sobrevêm após aquellas operações.

(Idem, Maio, 1877.)

Organisação do thrombo.—O Dr. Paul Baumgarten tira as seguintes conclusões de um recente trabalho seu:

1º—Para a organisação do thrombo vermelho (não para a do branco.

ou do mixto) concorrem dois processos reciprocamente independentes, a saber: a proliferação do endothelio vascular, e a que, partindo dos tecidos exteriores, invade os pontos comprehendidos na ligadura, e é a unica base da neoplasia vascular.

2º—O papel do coagulo na organização do thrombo é insignificante; apenas restão d'elle algumas massas de pigmento disseminadas no tecido. Realisào-se do mesmo modo os actos alludidos, quando se expelle o sangue dos pontos ligados.

Forão praticadas essas investigações em arterias ou veias isoladas da circulação por duas ligaduras, distantes mais de pollegada entre si.

Foi facil, principalmente nas arterias, verificar a proliferação vascular; a da membrana interna é muito difficil de apreciar.

Por investigações ultteriores convenceu-se o auctor que essa proliferação do endothelio após a ligadura, é identica com a se manifesta nas arterias do cerebro, em consequencia da syphilis ou de outras molestias.

(Schmidt's Jahrbucher, 1877, n. 2)

Trameto dos abcessos ossifluentes externos pelos causticos.—O Sr. Fourestié cita em sua these sete casos de abcessos provenientes de lesões osseas, de sede diversa da do mal inicial, não interessando, porem, as cavidades splanchnicas, os quaes forão tratados pelo Sr. Labbé do seguinte modo.

Depois de limitado o foco purulento, applicou-se uma compressa de diachylão em forma de anel, cujo raio era centimetro e meio pelo menos inferior ao do abcesso.

Descoberta a superficie deste era então posta em contacto com uma camada de massa de Vienna durante um quarto de hora, ao fim do qual, retirado o caustico, encontrava-se uma escara negra, que ultrapassava cinco millimetros a circumferencia interna da compressa.

Esta applicação, que é dolorosa, deve ser, nas creanças, precedida de anesthesia. Quatro dias depois começa o trabalho de eliminação, com pouca febre e algumas dores. Applicão-se então cataplasmas. Nunca se deve comprimir o foco para expellir o pus, que escorre espontaneamente por orificios multiplos; nem tão pouco servir-se do bisturi para profundar o sulco de separação, sendo preferiveis applicações successivas da massa de Canquoin.