

A queda total da escara succede uma ferida ja um pouco retrahida e coberta de magnificos botões carnosos. Os trajectos fistulosos que porventura se encontrem no fundo della, devem ser atravessados por flechas causticas. Dos casos alludidos, cinco tiveram exito mui favoravel. O Sr. Fourestié chegou a applicar o caustico em uma superficie de 17 centimetros de comprimento sobre nove de largura sem perigo nem alteração notavel do estado geral.

(Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques, Maio, 1877.)

Percussão dos ossos.—O Professor Lucke publicou (Centr. Bl. f. Chir) o resultado das suas investigações sobre a percussão dos ossos, com o fim de utilizar as variações de som nesses órgãos, como signaes diagnosticos das suas lesões pathologicas.

Nos ossos longos dão as epiphyses um som mais claro do que as diaphyses. Ossos analogos em um individuo são produzem sons de altura igual.

Fracturas recentemente consolidadas dão som obscuro; sendo, portanto, permittido dizer, que a obturação do canal medullar e o augmento de massa ossea se diagnosticão pela percussão.

Tambem obscuro é o som que apresentam as articulações cujas epiphyses são affectadas de osteite chronica central. Em um caso, porem, de gonite chronica era o som dado pelo tumor do lado doente muito mais claro que o do lado opposto.

Pratica-se a percussão dos ossos com o dedo ou com o martello, devendo haver o cuidado de suspender a extremidade, para evitar resonancia.

Tratamento da rectocelè.—No *Boston Med. and Surg. Journal* refere o Dr. Warner o seguinte facto:

Uma viuva, de 50 annos de idade e com 7 filhos, entrou em tratamento por causa de um polapso da parède posterior da vagina, do volume de um ovo de ganso, e correspondendo a uma bolsa da parede anterior do recto. Havendo ahi evidentemente mucosa em demasia, recorreu o auctor á seguinte operação: Fez uma incisão vertical no ponto culminante do prolapso, e, penetrando até a adventicia ou cellulosa pela vagina, separou esta do recto em quasi toda a extensão do prolapso, extirpando em fim, com tesoura a parte dissecada, que era oval e media 3 pollegadas de comprimento e 2 e meia de largura.