interessante e pode lançar muita luz sobre os domínios das paralysias reflexas.

(Lancet, 26 de Maio, 1877.)

Tratamento mecanico da dyspale a compuente a pleuro-pneumonia.—O professer en Mosengeil recentemente recorreo a uma modificação do processo de Sylvester para respiração artificial, com o fim de remediar dyspaca tenaz a um docnte, que se achava parcialmente restabelecido de pleuro-pneumonia, sobrevinda no curso de uma grave inflammação do labio inferior e de uma das maxillas. Esforçando-se o doente por palliar o seu mal com profundas inspirações thoracicas, e notando o professor que o ar, assim voluntaria e lentamente inspirado, dilatava o pulmão affectado quasi tam bem como o são, recorreo ao seguinte expediente:

Mandou deitar-se o doente de costas, com o thorax levemente elevado. Torceo-lhe depois um pouco as mãos e collocou os cotovellos mais ou menos em angulo recto, de modo que aquellas como estes descansavam pelo bordo cubital sobre o abdomen, perto do umbigo. Levantando, então, e ao principio de cada inspiração os braços com as mãos em completa supinação, elevou-os, quanto possível, até o ponto mais alto da cabeça, e trouxe-os de novo para baixo, para comprimir desta vez contra o thorax.

Repetio com tal exito a manobra, que em cerca de quinze minutos haviam cessado a dor e dyspnea, e expandião-se ambos os pulmões com igual força. Meia hora depois reapparecerão os symptomas; no dia seguinte, porem, produzio a repetição do processo allivio mais prolongado. Finalmente ja o doente, convencido dos seus beneficos resultados, se havia encarregado de executal-o.

Interessante foi que immediamente à applicação se tornaram os braços quasi completamente exangues. (Berliner Klinische Wochenschrift, Novembro 1876)

Thymo de volume consideravel encontrado em homem adulto.—0 Dr. Brigidi, de Florença, publicou este interessante caso:

Praticando a autopsia de um individuo affectado de tuberevlose

pulmonar, encarirsa, adiante da trachea, encostado ao coração, um corpo roseo, material 33 centimetros de comprimento, e de largura 70 millimetros caranin ponto e 54 em outro.

Are processo prolongada em alcool, pesava ainda 190 gramn Queste microscopico permittio reconhecer os elementos do thymo. O corpo estava consideravelmente hypertrophiado e semelhava a uma massa sarcomatosa. Esse desenvolvimento anormal de um verdadeiro tumor no mediastino não produzira accidente algum.

E' provavel que a percussão do coração, em tal caso, manifestando obscuridade bastante extensa, tivesse embaraçado a um medico, não prevenido da possibilidade de semelhante lesão. (Journal de Mèdicine et Cirurgie pratiques, Abril, 1877.)

Tremor na molestia de Parkinson (paralysia agitante).—O Progres Médical de 2 de Dezembro ultimo publica uma lição de Charcot sobre aquella molestia, na qual insiste particularmente nos pontos seguintes.

- 1. E' incorrecta a denominação de paralysia agitante. Não se pode com propriedade applicar o termo—paralysia a uma affecção, em que se mantem por muito tempo a energia muscular. O affixo—agitante—não é tambem absolutamente correcto; porque não se observa tremor em muitos casos de diagnostico indubitavel. Propõe o nome de molestia de Parkinson, em attenção ao medico inglez, que primeiro regularmente descreveo-a.
- 2. Charcot sustenta que o tremor, que affecta o tronco e os membros, não invade a cabeça e o pescoço. Nos casos em que a cabeça parece tremer, trata-se de oscillações que lhe são communicadas do tronco. Para proval-o, atou um ponteiro, com uma penna na extremidade, á fronte de um doente. Quando este se achava livre, agitava-se a penna continuamente; logo, porem, que se obstavão os movimentos, levantando, por exemplo, com força os membros superiores, permanecia em completo repouso. Repetio-se a experiencia em diversos doentes com o mesmo resultado.
- 3. Liga Charcot particular importancia ao facto, que o tremor não é symptoma necessario da molestia. Ha uma forma, em que elle é tão insignificante, que não o percebe o doente, ou não apparece senão ao terceiro ou quarto anno da affecção, podendo mesmo faltar em todo