

o seu decurso. O professor individualizou a historia de dous casos em que todos os symptomas da molestia, excepto o tremor, attingirão consideravel intensidade. Em um delles faltava completamente, em outro limitava-se á mão esquerda, do que mesmo o doente estava inconscio. Casos ha em que a attitude inteiriçada dos doentes, a extrema lentidão dos seus movimentos, a apathia da physionomia, o fluxo involuntario de saliva, as interrupções no fallar induzem a confundir a molestia com o amollecimento cerebral.

Nos factos que derão lugar a tal erro, era a rigidez accentuada de um lado.

As faculdades intellectuaes, todavia, permanecem intactas na molestia de Parkinson.

**Anatomia pathologica nas febres paludosas.**—O *London Medical Record* dá o seguinte resumo de cuidadas investigações de Kelsch sobre as variações numericas dos corpusculos vermelhos e brancos, que determinam aquelle estado morbido:

1. Durante o accesso diminuem os leucocytyos em muito maior proporção do que as hematias, ficando para estes na relação de  $\frac{1}{1000}$ ,  $\frac{1}{1200}$ ,  $\frac{1}{1600}$  ou de  $\frac{1}{2000}$ ; isto é, diminuem um terço, metade ou mais. Ordinariamente corresponde a minima á distensão maxima do braço.

2. A diminuição é rapida e continua; na primeira hora do accesso diminuem os leucocytyos incessantemente até um terço do numero supposto antes delle.

3. Depois do accesso o numero augmenta, porem muito mais lentamente do que havia descido; a relação physiologica não se restabelece senão quinze a vinte horas, ou mesmo um ou dous dias depois.

4. Ao principiar o accesso, ha pequeno, mas instantaneo, augmento dos leucocytyos; essa proposição requer todavia reserva, por serem poucas as occasiões de verificall-a.

Seguem-se as observações do autor sobre o estado do sangue durante a cachexia paludosa, acompanhada de infarcto splenico:

1. Ha diminiuição relativa dos corpusculos brancos, variando entre  $\frac{1}{800}$  e  $\frac{1}{2000}$ ; contam-se, porem, excepções.

2. O desapparecimento dos corpusculos brancos não é inteira-

mente proporcional ao volume do baço; o que se explica pela maior ou menor actividade das outras glandulas hemopoeticas.

3. A corrente induzida, applicada durante dez minutos á porção de baço, sob o bordo costellar, produzia sempre diminuição da obscuridade de som, na extensão de trez ou quatro dedos de largura; com isso coincidia augmento duplo ou triplo, e temporario, dos leucocyots. Ao fim de algumas horas se restabelecem as relações ordinarias.

4. Sob a influencia da electrisação, methodicamente continuada durante dous ou tres mezes, torna-se o baço menor, assim como o numero dos leucocyots augmenta. Este resultado é mais pronunciado ás primeiras applicações, do que mais tarde. Kelsch julga a electricidade util auxiliar ao tratamento desses casos.

5. Os corpusculos rubros tambem augmentam em numero á medida que decresce o baço.

6. O auctor julga provavel, mas não satisfactoriamente verificado, que o numero dos corpusculos rubros augmente durante electrisação d'aquelle orgão.

**Tratamento abortivo da variola.**—Guiado pela semelhança das pustulas produzidas pelo tartaro stibiado com as da variola, procurou o Dr. Esquerré, medico em Plaisance—du—Gers, experimentar a acção d'aquelle agente sobre a molestia; calculando, demais, aproveitar a sua propriedade emeto-cathartica, a febrifuga e a sudorifica. Como resultados notaveis se colhem os seguintes:

1. Rapidez da evolução da molestia: ao nono dia poderão os doentes dispensar o leito, após um periodo quasi nullo de suppuração.

2. Diminuição notavel da actividade morbifica do virus.

O Dr. Equerré observou a extinção rapida de epidemias, em localidades em que o seu tratamento foi applicado a alguns doentes.

O modo de administração do tartaro stibiado e o tratamento complementar são assim formulados:

1. Para os individuos de temperamento fraco, sobretudo, porem, para as mulheres gravidas ou em epoca de regras, administrar o emetico em clyster, logo aos primeiros symptomas prodromicos.

2. Se são doentes em circumstancias ordinarias, preparar uma porção de morphina com 5 centigrammas de tartaro stibiado, que