

mente proporcional ao volume do baço; o que se explica pela maior ou menor actividade das outras glandulas hemopoeticas.

3. A corrente induzida, applicada durante dez minutos á porção de baço, sob o bordo costellar, produzia sempre diminuição da obscuridade de som, na extensão de trez ou quatro dedos de largura; com isso coincidia augmento duplo ou triplo, e temporario, dos leucocyots. Ao fim de algumas horas se restabelecem as relações ordinarias.

4. Sob a influencia da electrisação, methodicamente continuada durante dous ou tres mezes, torna-se o baço menor, assim como o numero dos leucocyots augmenta. Este resultado é mais pronunciado ás primeiras applicações, do que mais tarde. Kelsch julga a electricidade util auxiliar ao tratamento desses casos.

5. Os corpusculos rubros tambem augmentam em numero á medida que decresce o baço.

6. O auctor julga provavel, mas não satisfactoriamente verificado, que o numero dos corpusculos rubros augmente durante electrisação d'aquelle orgão.

Tratamento abortivo da variola.—Guiado pela semelhança das pustulas produzidas pelo tartaro stibiado com as da variola, procurou o Dr. Esquerré, medico em Plaisance—du—Gers, experimentar a acção d'aquelle agente sobre a molestia; calculando, demais, aproveitar a sua propriedade emeto-cathartica, a febrifuga e a sudorifica. Como resultados notaveis se colhem os seguintes:

1. Rapidez da evolução da molestia: ao nono dia poderão os doentes dispensar o leito, após um periodo quasi nullo de suppuração.

2. Diminuição notavel da actividade morbifica do virus.

O Dr. Equerré observou a extinção rapida de epidemias, em localidades em que o seu tratamento foi applicado a alguns doentes.

O modo de administração do tartaro stibiado e o tratamento complementar são assim formulados:

1. Para os individuos de temperamento fraco, sobretudo, porem, para as mulheres gravidas ou em epoca de regras, administrar o emetico em clyster, logo aos primeiros symptomas prodromicos.

2. Se são doentes em circumstancias ordinarias, preparar uma porção de morphina com 5 centigrammas de tartaro stibiado, que

tomarão por colheres de sopa, primeiro, de hora em hora, até effeito vomitivo; depois, de trez em trez horas até apparecerem as primeiras papulas na face. Desde então, afastar progressivamente as doses, atrazando uma hora cada uma até ao termo de 24 horas.

3. Durante os oito dias, que se seguem á suspensão da medicação antimomial, administrar de quatro em quatro horas uma colher de sopa da seguinte poção:

Chlorureto de soda de Labarraque.....	4 grammas
Agua de louro-cereja.....	5 grammas
Xarope de quina.....	75 grammas
Vinho fraco e bom (Bordeaux). /.....	170 grammas

M.

4. Beberagens mucilaginosas e um pouco sudorificas com leite, até declinar a febre.

(*Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques*, Junho, 1877.)

Ileo spasmodico na hysteria.—Em uma sessão recente da *Sociedade de Medicina de Paris* leu o Dr. A. Voisin a nota de um caso, em que uma rapariga hysterica soffrera tres accesos de contracção spasmodica dos intestinos, com os mesmos symptomas de estrangulação que os de causa organica. Os dous primeiros cederão a antispasmodicos e a purgativos; o ultimo porem, foi fatal. A autopsia revelou vestigios de aperto simplesmente spasmodico do intestino. A esse caso accrescentou o Dr. Voisin o de uma mulher, sugeita a symptomas analogos, a qual não apresentava, todavia, vestigio de hysteria ou de outra qualquer molestia, alem de alguma impressionabilidade. Era o seu principal incommodo uma tympanite tão intensa, que chegou a difficultar-lhe seriamente a respiração. Havia ao mesmo tempo prisão de ventre e vomitos pertinazes. Continuando de dia em dia a se aggravarem taes symptomas, sem que os explicasse causa mecanica ou organica, suspeitou o Dr. Voisin que se tratava de simples spasmio. Introduzio no recto uma sonda esophagiana e, a certa altura, descobriu um aperto que conseguiu ultrapassar, evacuando-se logo grande quantidade de gazes inodoros. Repetio-se o catheterismo por alguns dias e a doente se restabeleceu.

(*Gazette Médicale de Paris*, 16 de Dezembro de 1876.)