

com quanto conserve este ainda o seu volume, tem sobre a marcha e a essencia da molestia (*The London Medical Record*, 15 Fevereiro, 1877.)

Ovariectomia vaginal.—No *Boston Medical and Surgical Journal* refere o Dr. Wing um exemplo d'esta operação. O exame da doente que é objecto da observação indicara, havia 4 annos, retroversão do utero, e um anno depois um tumor no espaço de Douglas, o qual se suspeitou ser constituido por um ovario. Entre outros symptomas que principiavão a tornar-se graves, sobresahia ultimamente prisão de ventre dolorosa e rebelde aos purgativos. Pelo toque rectal percebia-se que o tumor recalcava o intestino para o sacro. Duas punctões aspiradoras permitirão retirar um liquido, cujo exame fixou o diagnostico de kysto do ovario, proveniente de effusão hemorrhagica antiga. Sobrevindo mais tarde symptomas de septicemia, resolveo o Dr. Wing extirpar o tumor. Depois de applicar o speculo de Sims, penetrou o operador no espaço de Douglas, por uma incisão feita na parte superior da vagina. Verificando a existencia de um pequeno kysto do volume de uma laranja, alargou a incisão, fixou o tumor, incizou-o, e, depois de evacual-o torceo-o, trazendo-o para á vagina. Como as adherencias parecião delgadas, preferio o operador enuclear o kisto a ligal-o. Terminou a operação, applicando tres pontos de sutura á incisão, para prevenir hernia a de uma porção do intestino delgado, que se apresentara entre os labios da ferida; poupando todavia espaço para a introdução de uma sonda, quando necessaria. Um mez depois era satisfactorio o resultado.

Commentando o facto, lembra o Dr. Wing que foi Thomas de New-York, o primeiro que praticou a ovariectomia vaginal em Fevereiro de 1870. Julga-a o celebre gynecologista muito menos perigosa do que a ovariectomia abdominal

Repetirão-na com bom exito Gilmore, Battey e Davis. O auctor pensa que a sua indicação deve ser limitada aos pequenos kystos e aos casos em que a vida não é muito proxima e seriamente ameaçada. Entretanto, termina confessando que a operação não é certamente mais facil do que a ovariectomia abdominal, e que mesmo pode determinar complicações mais incommodas que as que accompanhão esta ultima.