

Luxação do appendice xiphoide durante a gravidez.—Em uma nota lida à Sociedade de Cirurgia, descreveo o Snr. Potailon um caso d'este genero. A doente, de 27 annos de idade, tinha trazido por algum tempo um espartilho muito apertado, com o fim de occultar o seu estado.

Ao setimo mez da gravidez, começou ella a notar um tumor doloroso na linha media, immediatamente para baixo do sterno. A dor tornou-se tão violenta durante o trabalho do parto, que foi necessario empregar o forceps. Deo se depois a consolidação, conservando a cartilagem, todavia, uma posição anormal. O Sr. Potailon conhece apenas dous casos semelhantes.

Contribuição á pathogenia da coqueluche.—O Dr. Tschamer, de Graz, tentou verificar as observações de Letzerich, que attribue a parasitas vegetaes a contagiosidade da coqueluche. Com o fim de caracterisar esses parasitas, examinou aquelle experimentador, alem dos escarros na molestia em questão, os da bronchite, da phtisica, da bronchiectasia.

Nestes encontrou sempre micrococcos e bacterias, isolados ou formando cadêas. Só duas vezes vio o Aspergillo no conteúdo de cavernas pulmonares, e ainda nas secreções do conducto auditivo e da carie ossea. O simples exame macroscopico dos escarros na coqueluche permite ver fluctuarem corpusculos brancos ou amarelhados, da dimensão de uma cabeça de alfinete, os quaes se precipitam no fundo do vaso, decorrido algum tempo.

São caracteristicos, augmentão com a intensidade da molestia, e podem se apresentar 1 ou 2 dias antes do periodo convulsivo.

Levados ao microscopio, uns em glycerina ou em agua, outros previamente conservados por 24 ou 36 horas em uma solução de potassa, parecem ser constituidos por cellulas epitheliaes e por um mycelio retiforme. Junto a elles encontrão-se sporos numerosos e brilhantes. Submettendo-os á cultura obteve o autor uma forma de cogumelo, que já tinha observado em uma laranja putrefeita e que depois soube encontrar-se tambem em batatas, maçãs e limões. Tendo inhalado pó, feito com a massa negra de uma laranja rica naquelles parasitas, sobreveio 4 dias depois ao Dr. Tschamer tosse, que ao oitavo dia tornou-se convulsiva. Examinando os proprios