

A estabilidade da posição, uma vez adquirida, attrahe hoje maior numero de candidatos aos concursos da faculdade; sendo, assim, esta uma manifestação até certo ponto ficticia de mais crescido amor ao professorado.—O tempo já mostrou, e virá mostrar de novo, a inconveniencia do systema reerguido depois de jazer por terra tanto tempo.

É um facto que deixa margem a reflexões, esse que se dá entre nós acerca de certas reformas; mal-provadas e condemnadas hoje, são amanhã restauradas como penhores dos mais promettedores fructos. É incomprehensivel e contradictorio, é, porém, a realidade. Isso acaba de verificar-se com a re-creação dos lentes substitutos, abolidos antes por motivos justos. O ensino é que se mantém sempre immutavel.....

Longe vae já esta missiva, meus prezados collegas; nada mais tenho a relatar-vos.

Vosso Collega—M.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

CIRURGIA, OPHTALMOLOGIA E OTOLOGIA.

Tratamento do genu valgum.—Descreve o Dr. Ogston no *Edinburgh Medical Journal* a seguinte operação, por elle praticada com o melhor exito, em um caso de genu valgum duplo e datando de 11 annos. Chloroformisado o doente e curvado fortemente o joelho esquerdo, indroduzio-se pela pelle um forte e comprido tenotomo na face interna da coxa, tres pollegadas e meia acima do condylo correspondente, até ao nivel do ramo interno de bifurcação da linha aspera. Dirigio-se a lamina successivamente para diante, para baixo e para fora, olhando o gume para o osso, até perceber-se-lhe a ponta ao nivel da chanfradura intercondylia. Retirou-se então o instrumento, cortando simultaneamente as partes molles a golpes fortes e vagarosos até ao periosteo.

Resultou uma ferida externa, de um terço de pollegada, formando a entrada de um canal subcutaneo, dirigido obliquamente para a face anterior do femur, e terminando no interior da articulação. Servindo-se então do instrumento de Adams para a divisão subcutanea do condylo do femur, serrou o operador o condylo interno de deante para traz, até quasi á cova poplitéa. A separação completa obteve-a elle, curvando a perna do doente para dentro e tomando como ponto de apoio o proprio joelho. A operação e o curativo fizeram-se segundo o methodo de Lister, e para manter a posição normal do membro, foi empregada a simples tala de Liston. Poucos dias depois foi de igual modo tratado o joelho direito. Sete semanas e meia depois da primeira operação, livre de accidentes, podia o doente levantar-se e executar movimentos inteiramente normaes. (*London Medical Record*, 15 de Julho de 1877.

Degeneração maligna dos tumores benignos; tratamento do cancro.—Na sessão de 6 de Abril do sexto congresso dos cirurgiões allemães chamou o Professor Esmarch a attenção sobre a influencia, que possão ter no desenvolvimento do cancro as diversas dyscrasias. Depois de descrever dous factos de transformação cancerosa do lupus, disse que de suas numerosas observações sobre essa molestia, e sobre a carie e as molestias das articulações, é forçado a concluir que a escrophula e a syphilis têm aqui um grande valor etiologico.

Quanto ao tratamento do cancro, não é o orador dos que mais desesperão.

Lembra um facto de Langenbeck, de Gottingen, concernente a uma mulher, que curou-se da sua affecção, ingerindo em grande dose, por desespero, o arsenico que lhe tinha receitado aquelle medico. O cancro, diz elle, é um producto epithelial, e, a acção do arsenico nas molestias da pelle indica que são as cellulas epitheliaes especialmente modificadas sob o seu uso. No tratamento do cancro, porém, pensa Esmarch que deve ser administrado em alta dose, mesmo até á produção de symptomas de envenenamento. Tem obtido assim admiraveis resultados. Auxilia o tratamento com a applicação diaria de pós compostos de arsenico, morphina, calomelanos e assucar. (*Idem, ibid.*)