

Resultou uma ferida externa, de um terço de pollegada, formando a entrada de um canal subcutaneo, dirigido obliquamente para a face anterior do femur, e terminando no interior da articulação. Servindo-se então do instrumento de Adams para a divisão subcutanea do condylo do femur, serrou o operador o condylo interno de deante para traz, até quasi á cova poplitéa. A separação completa obteve-a elle, curvando a perna do doente para dentro e tomando como ponto de apoio o proprio joelho. A operação e o curativo fizeram-se segundo o methodo de Lister, e para manter a posição normal do membro, foi empregada a simples tala de Liston. Poucos dias depois foi de igual modo tratado o joelho direito. Sete semanas e meia depois da primeira operação, livre de accidentes, podia o doente levantar-se e executar movimentos inteiramente normaes. (*London Medical Record*, 15 de Julho de 1877.

Degeneração maligna dos tumores benignos; tratamento do cancro.—Na sessão de 6 de Abril do sexto congresso dos cirurgiões allemães chamou o Professor Esmarch a attenção sobre a influencia, que possão ter no desenvolvimento do cancro as diversas dyscrasias. Depois de descrever dous factos de transformação cancerosa do lupus, disse que de suas numerosas observações sobre essa molestia, e sobre a carie e as molestias das articulações, é forçado a concluir que a escrophula e a syphilis têm aqui um grande valor etiologico.

Quanto ao tratamento do cancro, não é o orador dos que mais desesperão.

Lembra um facto de Langenbeck, de Gottingen, concernente a uma mulher, que curou-se da sua affecção, ingerindo em grande dose, por desespero, o arsenico que lhe tinha receitado aquelle medico. O cancro, diz elle, é um producto epithelial, e, a acção do arsenico nas molestias da pelle indica que são as cellulas epitheliaes especialmente modificadas sob o seu uso. No tratamento do cancro, porém, pensa Esmarch que deve ser administrado em alta dose, mesmo até á produção de symptomas de envenenamento. Tem obtido assim admiraveis resultados. Auxilia o tratamento com a applicação diaria de pós compostos de arsenico, morphina, calomelanos e assucar. (*Idem, ibid.*)