

Segundo os experimentos, a strychnina determina uma quantidade de leite 15 vezes maior do que a normal; a digitalina, assim como a cafeina, somente a quadrupla.

O Jaborandi é tambem um energico estimulante da mamma. Quanto ao effeito contrario, tem-no em alto grão o hydrato de chloral; o bromureto de potassio e a atropina, antagonistas da strychnina, não o manifestam tal que corresponda inteiramente á virtude estimulante desta.

O Dr. Rohrig lembra o que podem suggerir taes factos para o tratamento da galactorrhéa e da agalactia.

Influencia das aguas sulfurosas sobre a syphlis latente.—O Dr. E. Guntz, de Dresde, explica a propriedade que têm as aguas sulfurosas de tornar manifesta a syphlis latente, pela eliminação de mercurio que determinam, e o pleno desenvolvimento em que então e novamente entra o virus syphilitico, que ainda existia no corpo. O facto de se haver encontrado mercurio no figado um anno depois da absorpção da ultima dóse, suggerio áquelle medico que o cessar da eliminação do metal não indica a sua ausencia do organismo, e induzio-o a investigar, se, quando já é totalmente, pelos mais delicados methodos de reacção, inappreciavel na urina, poderiam as aguas sulfurosas provocar ainda nova eliminação d'elle. Verificou este facto em alguns casos, dous dias apenas após a administração das aguas; em outros, quatorze dias depois; em um destes continuou a eliminação até á oitava semana subsequente á interrupção do tratamento mercurial.

Acha-se o mercurio no organismo em estado de albuminato. Sob a influencia das aguas sulfurosas se inicia certa desagregação da albumina, o que se manifesta por um estado transitorio de pallidez, redução do volume do baço e do figado e augmento da excreção urinaria, que pode, segundo Guntz, ser dupla da normal.

Deve-se, por outro lado, admittir que as substancias albuminoides em geral, mas não exclusivamente aos corpusculos sanguineos, se une o virus syphilitico: provam-no o caso, em que se produzio infecção syphilitica por injeecção subcutanea de leite; e a transmissão da molestia pelo sperma, ainda quando ella é latente, quando perde o sangue a propriedade de contagio.

Quando, pois, se desagregão as substancias albuminoides, deve adquirir o virus, que lhes é adherente, novas condições de vida, e como parte ou producto daquellas, combinar-se com outros elementos organicos. Por tanto tempo quanto for susceptivel dessa propriedade, a infecção persistirá; aliás, continuará a destruição do virus, que, finalmente, será eliminado como producto terminal do movimento nutritivo.

Na cura da syphilis pelas aguas sulfurosas, manifesta-se um dos productos terminaes pelo augmento de eliminação da uréa; o outro, pela formação de hydratos de carbono, isto é, pela reabsorpção das syphilitides, de que resultão detritos gordurosos.

Que a symptomatologia da syphilis latente está com effeito em tal relação com esses phenomenos nutritivos, prova-o o augmento de eliminação da uréa durante a erupção das dermatoses syphiliticas; facto que verificou Guntz não só neste como nos exantheas febris, no seu periodo inicial.

Ação analogá á das agua sulfurosas tem o tratamento pela abstinencia, que determina a desagregação da albumina, sem, todavia, augmentar a eliminação do azoto pela ourina. Desde, porem, que se melhorão as condições da nutrição, reapparecem os symptomas da infecção, pois que não estavão aniquilados os seus productos, mas simplesmente reabsorvidos.

Meios de prevenir accessos epilepticos.— O Professor Nothnagel, de Jena, publicou um caso de epilepsia grave e typica, cujos accessos erão sempre precedidos de aura epigastrica. Era a doente uma senhora, de 37 annos de idade e victima do mal havia 19. Ultimamente, por conselho de um visinho, recorreu a um remedio, que mostrou-se infalivel todas as vezes que ponde ser administrado durante a aura. Consiste em engolir sal commum na dose de uma *mão cheia*.

(*London Medical Record*, Junho de 1877).

De outro medicamento para o mesmo fim dá noticia favoravel o Dr. Vallender. Diz este medico que ponde, em tres casos, extinguir ou pelo menos diminuir em gravidade e duração os accessos epilepticos, praticando uma injeção subcutanea de apomorphina durante a aura. A dose de alcaloide foi raramente de mais de um trintavo de grão.