

a aethetose, ou o facto acima citado, não é mais do que um specimen, de feições mais raras, da hystero-epilepsia.

*British Medical Journal*, december 15, 1877. — *Gazette Medicale de Paris*, 6 Fevr. 1878.

## RESENHA THERAPEUTICA

A therebentina na febre typhoide.—O Dr. White de Dublin affirma (*British Medical Journal*, Dezembro 15) não ter perdido nenhum caso de febre typhoide em que tivesse empregado a therebentina. Sua formula ainda nos casos complicados de bronchite e diarrrhéa, é a seguinte:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| R. Oleo essencial de therebentina..... | } ana 7, 5 grammas |
| Solução de potassa.....                |                    |
| Mucilagem de acacia.....               | 15 grammas         |
| Xarope de papoulas brancas.....        | } ana 30 grammas   |
| Xarope de flores de laranja.....       |                    |
| Agua de camphora—q. s. para fazer      |                    |
| 240 grammas de liquido.                |                    |

Mande para tomar uma colher de sopa de 4 em 4 horas. Agitando previamente o liquido.

Applicações e formulas do choral.—O Dr. J. Bigelow de Indianopolis communica (*American Practitioner*, Dezembro 1877) um caso de cura do tetano pela applicação topica na ferida, de cerca de quatro grammas de choral de uma só vez.

Mr. W. T. Tocher recommenda para o linimento de chloral e camphora, que tem uma poderosa applicação anti-nevralgica, a seguinte formula:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Hydrato de choral..... | } ana 30 grammos |
| Camphora.....          |                  |
| Glycerina.....         | 240 grammos      |

Pulverise a camphora como é de costume com algumas gottas de alcohol rectificado, misture depois ao chloral, e deixe ficar a mis-