

tura no gral até que se torne líquida. Passe então para uma garrafa, addicione a glicerina e agite.

O acido salycilico, novas applicações.— O Dr. J. Spinzer (*Ohio Medical Recorder*, Setembro) em um caso de erysipela idiopathica empregou topicamente 30 grãos de acido salycilico em uma onça de glicerina com resultado rapido e muitissimo favoravel.

O Dr. Grollet recommenda em um trabalho interessante as injeções de acido salycilico na leucorrhéa.

A noz vomica a nas nauseas e vomitos da prenhez.— O Dr. G. C. Smith (*Pacific Medical and Surgical Journal*) menciona o emprego vantajoso da formula séguinte:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| R. Tint. de noz vomica..... | } ana 60 grammos |
| Solução de bismutho | |

Mande para tomar as colherinhas de chá, 3 ou quatro vezes ao dia, depois da comida.

Injecções hypodermicas de morphina para prevenir o aborto.— Em sete casos de aborto imminente, o Dr. Isham de Cincinnati empregou a morphina pela bocca ou em injeções hypodermicas. Em todos os casos pararam as contracções uterinas e a hemorrhagia. Em 4 a prenhez proseguio seu curso e chegou ao termo; dos outros tres, dous tinham já o feto morto quando se fez a applicação da morphina.

Tratamento do eczema infantil.— O Dr. Allbutt, aconselha no *British Medical Journal* de 24 de Novembro na forma inflammatoria aguda, periodo exsudativo, o seguinte:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Oleo de amendoas doces..... | 60 grammos |
| Oleo de amendoas amargas..... | 20 gottas |

Unja a superficie affectada duas ou tres vezes por dia.

No periodo escamoso a therebentina pode ser usada do mesmo modo. Internamente o acido nitrico diluido em doses gradualmente augmentadas conforme a idade, associado ao decocto de quina amarella, e algumas vezes oleo de figado.