

Em resumo, conclue Bouchut, pode-se obter a ischemia forçada da glandula mamaria por uma compressão permanente feita por meio do caoutchouc vulcanisado.

A ischemia permanente determina a atrophia gradual desta glandula.

Applicada ao tratamento do cancro e dos adenomas do seio, a ischemia pode suspender a circuição capillar destas produções morbidas e determinar-lhes a cura por atrophia.

O melhor meio de produzir a ischemia do seio e do cancro ou das glandulas deste orgão é a applicação permanente de uma coiraça compressiva de caoutchouc vulcanisado forrada por algumas camadas de algodão.

Mouvement Medical. Março 16 de 1878.

O tratamento faradico dos fibroides do utero.—O Dr. Everett tendo usado muitas vezes e com vantagem a corrente faradica em casos de inercia do utero, de placenta previa, de hemorrhagia post-partum, em substituição ao centeio, foi levado por um raciocinio de analogia a empregal-a em casos de fibroides do utero.

O centeio tem sido usado neste estado morbido, endermicamente, por ingestão, levado a substancia do tumor, com maior ou menor successo por Hildebrandt, White, Byford, Chroback, Jackson, e muitos outros. Entretanto o uso do centeio offerece as seguintes objecções: a difficuldade de obter um preparado digno de confiança; sua tendencia a perturbar a nutrição e as secreções; os symptomas cerebraes assustadores que ordinariamente acompanham sua administração continuada—; sua tendencia a produzir inflammações locais do estomago, intestinos e utero; a dor intensa que sempre produz, e os abcessos que ordinariamente se manifestam por seu uso pelo methodo hypodermico. Estas e outras razões levaram Everett a optar pela corrente faradica no tratamento dos casos de sua pratica.

De oito casos que o auctor refere e em alguns dos quaes o neoplasma havia adquirido não pequeno desenvolvimento, e até consistencia cartilaginosa, deduz as seguintes conclusões:

A corrente faradica judiciosamente empregada é tão potente quanto as preparações de centeio para produzir as contracções uterinas.

E' mais facilmente dirigida, pode ser começada ou interrompida em um momento dado, e a dose pode assim ser mais judiciosamente proporcionada.

Nunca perturba a nutrição ou as secreções, e não interfere com a digestão.

Nunca produz dor em órgãos distantes, nem é seguida de perturbações cephalicas ou abalo nervoso.

Nunca produz inflammações ou outras lesões locais.

*The American Journal of Obstetrics*—January—1878.

Kistos do ovario abertos no intestino.—

M. Terrier publica a seguinte observação:

Uma doente de 31 annos, soffrendo ha dous annos de um kisto do ovario volta ao serviço de M. Lepine em Beaujon, um mez depois de ahí ter estado parida. E' anemica, tem accessos diarios de febre, sente nas ilhargas, quando se deita, uma dor que a impede de dormir. O ventre augmenta notavelmente de volume.

Doze dias mais tarde, indo melhor a doente, nota-se-lhe o umbigo vermelho. No dia seguinte, o tumor depois de ter sido mais duro e sensível, torna-se de repente muito menos tenso e menos doloroso. Quasi que immediatamente depois começa-lhe uma diarrhéa colliquativa de 10 a 15 dejecções por dia. Nos dias subsequentes o ventre continua a desinchar, o tumor torna-se muito molle e denota claramente a presença de gases. Cedo cessa a diarrhéa e é substituida pela emissão de gazes extremamente fetidos. Ruidos hydroaericos pela succussão.

O tumor desfez-se gradualmente e a doente restabe-