

racterisada por um ruido hydroaerico, facilitando o diagnostico não pode revestir um criterio infallivel, porque concebe-se que espontaneamente se desenvolvam gazes na cavidade do kisto como acontece nos abcessos frios e em outros kistos.

Lumpe assignalou um phenomeno muito interessante, o augmento muito notavel da secreção urinaria até o momento da ruptura do kisto no intestino.

Quanto ao prognostico, Terrier affirma que se pode ter como terminação favoravel a abertura do kisto no intestino—quando a cavidade é unica e o liquido se esvasia bem, consequentemente a abertura no recto é a mais favoravel. Se alguma destas condições não se realisa, o esgotamento produzido por uma suppuração interminavel ou a infecção putrida fará quasi que fatalmente succumbir a enferma.

Em 35 observações que o auctor poude reunir, só 17 são tão precisas e minuciosas que se prestem a estatistica; e nestas 17, ha 6 mortes para 11 curas. Mais favoraveis seriam os resultados, opina Terrier, se não se limitasse o pratico a deixar a natureza entregue a si.

Em alguns casos não conviria intervir? Dilatando o tracto fistuloso quando accessivel (até certa altura do recto) para praticar injecções anti-septicas, ou penetrando no kisto pela parede abdominal, por meio de causticos, por exemplo, para evacual-o.

Emfim, accrescenta o auctor, não poder-se-hia praticar a ovariectomia, procurando conservar intacta a adherencia do kisto ao intestino, e fixal-a fóra como se se tratasse de uma parede kistica muito adherente?

Revue mensuelle de Médecine et Chirurgie—Gazette Medicale de Paris—Março de 1878.

Echinococcus multiplos do peritoneu.—O Dr. Geissel refere um caso de hydatides do peritoneu que foi confundido com um kisto multilocular do ovario. A ovariectomia foi praticada e seguida de morte. Trata-

va-se de uma mulher de 46 annos que soffria ha 9 ou 10. Pelo exame, todos os signaes physicos eram de uma kisto multilocular.

O Dr. Geissel a instancias da doente praticou a ovariectomia. A incisão feita da symphise do pubis até um pouco abaixo de appendice ensiforme revelou o facto de que o tumor consistia em hydatides do peritoneu adherentes as paredes abdominaes e a outros pontos; os kistos variavam em tamanho de uma ervilha a uma avelã. Havia dous grandes, cada um com o volume de uma cabeça de creança, no meio do abdomen. O Dr. Geissel extrahiu 27 dos pequenos e os 2 grandes—Ligaduras de fios de tripa (catgut) foram empregados para parar a hemorrhagia, que foi pouco consideravel.

Diversos kistos rebentaram-se durante a operação, e sujaram de pus a cavidade abdominal. A morte teve logar cinco horas depois da operação, que durou duas horas e um quarto.

Deutsche Medicinische Wochenschrift. Oct. 1877. *The London Medical Record.* Jan. 15. 1878.

NECROLOGIA



CLAUDIO BERNARD

A sciencia humana acaba de soffrer um abalo profundo e inesperado. Apagou-se no meio das lutas que foram o seu alimento de tantos annos, a intelligencia privilegiada de um dos maiores genios deste seculo. Claudio Bernard, o grande explorador da physiologia, succumbio com as armas em punho, deixando em meio a serie immensa de deducções scientificas que deviam surgir dos descobrimentos brillhantes a que tinham chegado o