

de numero de cearenses que a teem trazido, ou que a teem contrahido aqui.

Junho 20—1878.

S. L.

---

## CIRURGIA

---

CASO DE HERNIA ESTRANGULADA; DUAS PORÇÕES INDEPENDENTES DE INTESTINO DENTRO DO SACO.

Pelo Dr. J. L. Paterson

Ignoro-se é raro ou não o estado de cousas manifestado no seguinte caso de hernia estrangulada; mas não o tendo encontrado em nenhuma operação anterior que eu tenha praticado, ou visto praticar, julgo haver alguma utilidade em registral-o.

Fui chamado no domingo 28 d'Abril ultimo, ás 8 horas da noite, para ver um preto de 56 annos de idade com uma hernia inguinal direita estrangulada.

A hernia era antiga, e elle para contel-a servia-se de uma funda tosca, apesar da qual descia frequentemente o intestino, que o proprio enfermo, entretanto, facilmente reduzia.

A's 8 horas da manhã d'aquelle dia, isto é, 12 horas antes de eu o ver, sahira a hernia, e elle não a poude recolher. Sentia dôr forte no sitio do estrangulamento e á roda do umbigo, e tinha vomitos se tentava tomar algum alimento.

Nenhuma evacuação alvina; pulso e calor da pelle normaes. Não havia soluços, nem anciedade notavel.

O lado direito do escroto estava amplamente distendido; tinha um aspto pyriforme, appresentando, todavia, um bôjo sobreposto, na parte superior, sitio onde também o inchaço era muitissimo tenso.

A percussão fazia ouvir um som tympanico sobre todo elle, e especialmente na parte inferior.

Pratiquei a taxis por breve espaço de tempo, mas inutilmente; e posto não fossem urgentes os symptomas, a tensão do tumor na sua porção mais alta, e a dôr consideravel despertada ahi pela manipulação decidiram-me a praticar desde logo a operação, em vez de esperar para a manhã seguinte.

Conferenciei ás 10 e meia com o Dr. Silva Lima, e não obtendo elle, tão pouco, o minimo proveito com a taxis, procedi immediatamente á operação, que o paciente pediu fosse praticada sem chloroformio.

Aberto o sacco viu-se que a prominencia da parte superior era produzida por uma hernia recente, que descêra em uma volta singela adiante da antiga, que occupava, em muitas dobras, o resto do escroto, estando a primeira porção de intestino achatada, e a segunda distendida por gazes.

O aperto era no anel interno, por onde se viam passar simultaneamente, e uns a par dos outros, quatro cylindros de intestino. Era a hernia recente, entalada entre a antiga e o bordo anterior do anel, que occasionava o estrangulamento.

Dividido o anel constrictor, o que foi feito directamente para cima, reduzi primeiro a hernia antiga, deixando a outra intacta; esta, que foi logo depois recolhida, estava muito congesta, e ecchymosado o mesenterio no ponto do aperto, justificando plenamente o termos recorrido á operação tão cedo como o fizemos.

Os labios da ferida foram exactamente unidos por tres pontos de sutura com linha, e, nos intervallos d'estes, por muitos outros com crinas, sem nenhuma outra especie de curativo. Foram administradas vinte gottas de laudano de Sydenham ao doente, que dormiu bem. Não houve mais vomitos nem dôr depois da operação.

Na tarde seguinte houve uma evacuação intestinal espontanea; á noite repetiu-se a mesma dose de lauda-

no, e na tarde seguinte, 40 horas depois da operação, foram tirados todos os pontos de sutura, estando a ferida perfeitamente fechada por primeira intenção, sem que apparecesse uma só gotta de sangue, serosidade, ou pus. Attribúo este excellento resultado, sem levar em conta a peculiar aptidão da parte para a cura por primeira intenção, a terem sido perfeitamente reunidos os bordos da ferida pelos numerosos, porem muito finos pontos de sutura de crina, a serem estes removidos cedo, e á ausencia de todo e qualquer apposito.

Junho de 1878.

---

## MEDICINA

---

### MEMORIA SOBRE A DIARRHÉA DENOMINADA « DA COCHINCHINA »

Pelo Dr. A. Normand

da marinha franceza

( Traducção de \* \* \* )

(Continuado do numero antecedente, p. 216)

*Medicação anti-catharral.*—E' a unica de que tenho até agora obtido successos completos e com a ajuda de um só agente—o leite; mas a esterilidade de nossos conhecimentos sobre muitos pontos de physiologia therapeutica obriga-nos a decompor a acção geral do leite em muitas acções secundarias que o prendem a tres; pelo menos, das medicações que estudo com relação á molestia da China. O leite é positivamente um toxico para o verme.

Tenho-o misturado com materias contendo vermes, observando que estes mais cedo perdiam seus movimentos e a vida, do que nas preparações onde a agua