

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

CIRURGIA E OPHTHALMOLOGIA

Hydrocele bilocular abdominal nas creanças.—O Dr. Kocher, de Berne, chama a attenção na *Centralblatt für chirurgie* para uma forma de hydrocele nas creanças, em que o fluido impellido pela pressão corre para um sacco abdominal, e não para a cavidade peritoneal. Achou-a duas vezes em rapazes de 13 annos d'idade, e poudo por meio do exame externo e rectal, sob o chloroformio, verificar a posição e forma do sacco para onde se escapava o fluido. Os casos foram curados como na hydrocele ordinaria pela punctura e injeccão de iodo em uma solução de iodureto de potassio (*British Med. Journal*, Setembro 1878).

Estreitamento cicatricial do esophago; Gastrotomia seguida de cura.—Imaginada em 1849, a gastrotomia foi practicada muitas vezes, mas somente em 1876 foi pela primeira vez bem succedida, sendo operada pelo Dr. Verneuil.

O professor Trendeleburg recorreo igualmente a esta operação n'um caso que aqui damos em resumo, da traducção publicada pelo Sr. Aigre no *France Medicale*.

« Um menino de nove annos engolio, por descuido, um gole de acido sulphurico. Um mez depois se manifestaram os primeiros symptomas de dysphagia, combatidos pelo catheterismo do esophago. Em breve porém o estreitamento tornou-se franqueavel ás sondas exploradoras; o doente comtudo não podia engolir senão leite.

Chegando ao ultimo gráo de abatimento, foi decidida e praticada a operação.

« Uma incisão de 4 a 5 centimentros de comprimento, seguindo uma linha obliqua de cima para baixo, e da