

Tratamento do keratocone.—pelo Dr. Panas E' pouco conhecida a pathogenia d'esta affecção. Entretanto se a aproximarmos do resultado de uma experiencia feita por His em coelhos, pode suppor-se que se trata de uma alteração particular da membrana endothelial que reveste a face posterior da cornea.

Se a exemplo d'este experimentador, se raspar por meio de uma agulha curva a face posterior da cornea determinar-se-ha uma alteração que em breve acarreta a formação de um keratocone. Alem d'isso produz-se um facto que tambem se dá no keratocone expontaneo, isto é, a filtração do humor aquoso atravez da cornea. Ora como é provavel que esta alteração do endothelio seja central e apenas limitada a um ponto, é logico suppor que, desembaraçando-se d'essa parte a cornea, se pode alcançar a cura. E isso é o que aconselhava Graefe como tratamento, sem comtudo fazel-o na espessura total da cornea.

Em um dos seus doentes o Dr. Panas empregou o methodo operatorio de Bader. Consiste em tirar nm retalho completo da cornea. Correu humor aquoso, e depois, graças á ligadura compressiva, fez-se a cicatrização e com ella desapareceu quasi completamente a conicidade da cornea. Mas sobreveio exagero da tensão intraocular. o Dr. Panas praticou então uma iridectomia e com injeccões de morphina fez desaparecer a photophobia, meio excellente, que elle recommenda sempre para este accidente particular; sob a sua influencia o estado do olho melhorou consideravelmente. A marcha da doença susteve-se ao que pareceu, mas a vista não ficou melhor do que anteriormente. (*Journal de Médecine et de chirurgie*—Julho 1878.)