

medicos actuaes. Conta hoje 600 volumes de obras importantes, algumas das quaes tem sido offerecidas por illustres Professores e por medicos distinctos.

Ultimamente tem sido recebidas diversas obras modernas que, pela sua importancia, tem chamado a concorrência dos alumnos, a ponto de tornar o numero de leitores muito crescido relativamente ao dos annos anteriores.

O serviço interno da Faculdade é feito por onze ser-ventes que são nomeados pelo Director.

Dr. Manoel José de Araujo.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

OBSTETRICIA E GYNECOLOGIA

Metrorrhagia por inserção viciosa da placenta; injeções sub-cutaneas de ergotina e estimulantes; extracção a forceps.—O Dr. Chantreuil refere (*Journal de Therapeutique* Fevereiro 1878) d'entre outros o seguinte caso: Uma mulher de 22 annos d'idade, no setimo mez da segunda gravidez, foi dentro de tres semanas atacada por tres violentas hemorragias. O Dr. Chantreuil achou a mulher muito enfraquecida, sem contracções uterinas, o collo do utero do comprimento normal, os ruidos fetaes a esquerda da linha media, a cabeça elevada, mas já em parte introduzida na fossa iliaca. A placenta, inserindo-se no segmento inferior do utero, impedia a descida da cabeça na excavação; o orificio externo do collo estava meio aberto. O Dr. Chantreuil applicou um tampo forte de fios, depois de cuja extracção, 2½ horas mais tarde, deu-se nova e violenta hemorragia, seguida de syncope. Apesar da applicação de novo tampo, e altas doses de rhau, a mulher no dia seguinte estava esgotada no mais alto grão, pallida, anemica, e sem que apparecessem signaes

de contracções uterinas; o pulso filiforme, apenas perceptível, soluços, vomitos.

Mais tarde ligeiras contracções, perceptíveis de vez em quando através das paredes abdominaes, A's 2 horas da tarde foi o tampo cuidadosamente retirado, sem que houvesse hemorragia; a placenta foi completamente despegada, e através do collo soffrivelmente dilatado foi rota a bolsa das aguas. Depois da extracção da placenta destacada, a cabeça desceo logo á pequena bacia, e por meio do forceps foi extrahido um fêto morto já de muito tempo e pouco desenvolvido. Immediatamente depois a parturiente cahio em forte syncope; fez-se aspersion d'agua fria no rosto, e fricções no abdomen. Não permittindo o estomago o emprego do canteio internamente, fizeram-se injeções hypodermicas com uma solução de ergotina de Bonjean e agua distillada, ana 8 grammas. Em meia hora foram injectadas 4 seringas, tendo cada uma 0,35 de ergotina, e contrahindo-se então o utero não houve mais perda de sangue. Continuando porém a puerpera em extrema fraqueza, fez o Dr. Chantreuil injeções de cognac.

Na manhan seguinte duas injeções hypodermicas de chlorhydrato de morphina, deram-lhe um somno de muitas horas. Alem d'isto clysteres de caldo de carne, leite, e vinho com agua. Depois da applicação d'um vesicatorio volante no epigastrio, no 2º dia, poudo a doente tolerar os caldos de carne e leite, e começou então a convalescença, somente perturbada por uma ligeira phlegmasia alba dolens, até a completa cura.

Depois d'este caso, o Dr. Chautreuil empregou ainda as injeções subcutaneas de ether, com o mesmo feliz resultado, em 4 casos de metrorrhagia, 2 consecutivas a aborto, e 2 depois de partos normaes, e considera este meio capaz de substituir a transfusão de sangue, quasi sempre arriscado. Se este é inevitavel, tem-se ainda assim nas injeções de ether um meio de ganhar tempo, para preparar os appaarelhos necessarios a uma transfusão (*Krug. Schmidt's Jahrbuch* n. 7º, 1878.)

Tratamento da esterilidade.—O Dr. Theopold (*Deutsche med. Wochenschr* IV. 1878) combate o tratamento operativo da esterilidade, por incisões ou excisões cuneiformes do collo do