

tuero, porque o tecido cicatricial e a exuberancia da mucosa contrariam o fim da operação. Recommenda *amollecere* o collo do utero por injeções d'agua morna diariamente repetidas, e depois, duas vezes por semana *dilatarse* o collo pelo dilatador de Ellinger, e no dia anterior ao apparecimento da menstruação, quando esta é dolorosa.

Em tres casos este methodo doo ao auctor feliz resultado em senhoras com 1, 2 e $1\frac{1}{2}$ e 6 annos de casadas.

Indicações e contra-indicações da ovariectomia no tratamento dos kystos do ovario.—Com este titulo o Sr. Simon Duplay apresentou á Academia de Medicina de Paris um trabalho, cujas conclusões são as seguintes:

1.^a Antes de estabelecer a questão das indicações da ovariectomia, o cirurgião deve ter feito um diagnostico, o mais rigoroso possível, e praticado uma punctura exploradora.

2.^a Relativamente á época em que convem fazer a ovariectomia, repellido a operação precoce, e considero que a ovariectomia é somente indicada, quando o kysto se tem tornado, por seu volume, uma causa de excessivo incommodo para os doentes, ou pelos accidentes locais e geraes determina, uma causa de risco imminente.

3.^a A ovariectomia tardia, posto que não deva ser adoptada como regra geral, não é entretanto contra-indicada pela existencia das complicações locais e geraes mais graves, como peritonite, inflammation, suppuração, prenhez do kysto.

4.^a A ovariectomia é formalmente contra-indicada nos casos de kysto do ovario, complicados de molestias geraes ou locais, independentes da presença do kysto, e susceptiveis de causar, por sua evolução ulterior, a morte dos doentes.

5.^a As diversas condições locais dependentes do estado do kysto (paredes e conteúdo), de suas conexões (adherencias), do estado do peritonéo (ascite), não são senão de mediocre importancia quanto ás indicações e contra indicações da ovariectomia. Faço entretanto duas excepções a esta proposição geral: a primeira é relativa aos kystos multiloculares, de conteúdo seroso, não albuminoso, para os quaes a ovariectomia me parece geralmente contra-indicada; a segunda é relativa ás adherencias extensas do lado da pequena bacia e dos or-

gãos que n'ella estão contidos (utero, bexiga), e que, sobretudo quando se acompanham de ascite abundante, indicam ás mais das vezes uma affecção maligna, ou pelo menos muito c6mplexa. N'estes casos, sem proscreever definitivamente a ovariectomia, aconselharia retardal-a quanto possivel.

6.ª Emfim, a ovariectomia 6 applicavel aos kystos do ovario complicados de prenhez, quando a vida da m6e e da creança s6o directamente ameaçadas pelo desenvolvimento do tumor, e a punctura fica sem effeito. (*Gazette Medicale de Paris*, Novembro 2 de 1878.)

NOTICIARIO

Salubridade Publica.—No relatório com que o Sr. Bar6o Homem de Mello passou a administraç6o da provincia, no dia 25 do passado, ao 2.º Vice-Presidente, lê-se o seguinte:

« A febre amarella, que ainda n6o deixou de grassar no ancordouro da capital, com mais ou menos intensidade, impoz a necessidade de conservar-se ainda aberto o hospital do Mont-serrat, destinado ao tratamento dos individuos accommettidos d'essa enfermidade.

Felizmente n6o se t6m dado casos de febres de mau caracter na provincia; mas a variola tem-se desenvolvido em diversos logares. Para combater os effeitos de t6o terrivel flagello, tenho nomeado facultativos incumbidos do tratamento das pessoas indigentes.

Assim providenciei no sentido de serem curados os variolosos de Santo Antonio da Barra, Caravellas, Inhambupe, Feira de Sant'Anna, Abrantes e Entre-Rios.

N6o tenho cessado de recommendar 6s autoridades policiaes que aconselhem 6s pessoas residentes em seus districtos a se vaccinarem e 6s camaras municipaes que ponham em execuç6o as posturas relativas 6 vacinaç6o.

Merecendo-me todo cuidado t6o importante ramo de serviço publico, e para dar maior desenvolvimento 6 propagaç6o da vaccina, reformei o regulamento do instituto vaccinico, creando mais um