

que pode a menstruação perdurar depois de tal mutilação. (*Jahrb. f. pract. Arzt.* 1878, pag. 454.

Quando deve ser cortado o cordão umbilical?—É sabido que quando se liga o cordão umbilical logo depois que cessão as suas pulsações, fica na placenta consideravel quantidade de sangue. O Prof. Zeifel procurou determinar essa quantidade, e verificou que é approximadamente de 192 grammas. Quando, porem, se adia a ligadura até ao momento em que é expulsa a placenta, não restão nesta senão 91 grammas.

Pelo primeiro processo subtrahem-se, pois, á creança cerca de 100 grammas de sangue. Parece obvio que, [em circumstancias ordinarias, dever-se-hia preferir o segundo.

(*Archiv f. Gynecologie.* 1878, 3. *Hefert.* pag. 461. )

J. A.

---

## RESENHA THERAPEUTICA

---

### EMPREGO THERAPEUTICO DOS SAES DE CONINA.

A cicuta cujo alcaloide é a conina ou cicutina tem sido em todos os tempos empregada contra o cancro, a scrophula, a syphilis e as affecções espasmódicas ou laryngéas acompanhadas de phenomenos espasmódicos.

Até aqui se considerava este alcaloide como excessivamente tónico e só se o administrava em doses mui pequenas. M. Tyryakian acaba, porém, de demonstrar, em uma these que constitue um estudo physiologico e clinico extremamente completo sobre o corrimento e seus saes, que esta substancia era muito menos venenosa do que se suppunha, e que de outro lado ella produzia todos os effeitos attribuidos á cicuta.

Experiencias numerosissimas, que revelaram o modo