

ahi contido extrahe, porém, mui pequena porção, acreditando que é elle indispensavel á nutrição do systema nervoso. Segue-se a injecção de 8 grammas do seguinte glycereo: iodo 0,60, iodureto de potassio 1,80 gramma, glycerina 30,0; podendo ser repetida muitas vezes e com intervallos convenientes. A reacção é quasi sempre insignificante. Manifestaram—se algumas vezes symptomas de collapso; cedendo, porém, logo ao uso do alcool. Dos 15 casos, todos concernentes a crianças de menos de 1 anno, 12 terminaram pelo restabelecimento completo.

O mau exito dos outros 3 foi devido a complicações. (*Jahrbuch fur practische Aerzte*, 1878.)

Novo processo operatorio contra a phimosi-sis.— Impressionado pelos inconvenientes que apresentam as operações sangrentas, geralmente praticadas contra a phimosi-sis, propoz o Dr. Jude Hue recentemente dividir o prepucio, na linha media e na face dorsal, por uma ligadura elastica, etc. Introduz, neste intuito, entre o prepucio e a glande uma agulha munida de uma estreita tira elastica, faz a transfixão e amarra as duas pontas na borda livre do prepucio. Em 10 a 15 dias cahe a ligadura, terminando assim a operação.

O Dr. Hórteloup convidou o auctor do processo a pratical-o em doentes do seu hospital.

Não parecerão logo muito animadores os primeiros resultados, por se terem os doentes queixado de dores durante 24 a 48 horas. A vista, porém, dos effeitos ulteriores, observados 3 mezes depois, julga o Dr. Hórteloup poder aconselhar este simples methodo para os casos de phimosi-sis sem hypertrophia do prepucio, particularmente nas crianças. (*Progrès Médical*)

Fractura seguida de effusão de oleo.—O Dr. Terrier refere um caso, em que dois mezes depois de uma fractura dos dois ossos da perna direita, em um homem de 28 annos de idade, apresentou-se perto da sede da lesão um pequeno tumor fluctuante e indolente. Tendo feito a punctura recolheu aquelle medico tres grammas de um liquido espesso, semelhante a azeite, destituído de elementos anatomicos e constituido, segundo exame chimico ulterior, de margarina, de pequena porção de oteina e de alguns vestigios de cholesterina. Após varias puncturas e emprego de forte compressão, cessara a effusão oleosa completamente ao fim da undecima semana. O Dr. Terrier resume do seguinte modo as suas considerações sobre este facto e outros da mesma ordem: