

Vômitos incoercíveis durante a gravidez — Eis ahí um meio simples e rápido de combater este incommo estado. Desde o momento em que apparecem os vômitos, e melhor, desde que se manifestam as náuseas, que sempre os precedem, deve applicar-se, com o auxilio do aparelho de Richardson, uma duche de ether pulverisado sobre a columna vertebral, por espaço de tres a cinco minutos, ou mais tempo se necessario for, e é bem supportada, cada tres horas: pôde repetir-se esta duche nos casos rebeldes: as duches de ether alternam-se com as de chloroformio.

O Dr. Tubelski, medico dos hospitaes de Varsovia, recommenda muito este tratamento, e diz que o alivio é rápido e constante.

Tambem julga, posto que o não tenha ensaiado, que este tratamento dará bons resultados na choréa, nos accessos de asthma, e na coqueluche.

Sendo, com tanta frequencia, tam rebeldes os vômitos, durante a gravidez, que contra elles se empregam todos os recursos conhecidos até hoje, julgamos que nada pôde perder-se em ensaiar os duches de ether.

(*Los Avisos, seg. o Journ. de Pharm. e sc. acc. de Lisboa.*)

Tratamento do antraz.—O Dr. Clever refere a cura d'um antraz, que occupava a região glutea, e cujo diametro media perto de 8 pollegadas, por meio das injeções sub cutaneas de acido carbonico a 2 por 100. A doente era uma mulher de 60 annos, de constituição debil, e foram necessarias dezoito injeções em roda do tumor, para que em dous dias a febre e a dôr desaparecessem. Ao quarto dia desapareceu tambem a infiltração. A cicatrização foi rapida.

Eis um meio, que muito convem experimentar, e aproveitar, caso se chegue a verificar a efficacia annunciada.

Sabe-se quão doloroso é este padecimento, e as difficuldades, que se encontram para diminuir a suppuração, que alem de enfraquecer o doente, tem o grande risco de sua absorção.

(*Journ. de pharm. e sc. acc. de Lisboa.*)

Tratamento do bocio pelas injeções de ergotina.—O uso da ergotina em injeções hypodermicas parece que de dia para dia adquire novas applicações. Alem do seu emprego nas metrorrhagias, e cujos resultados já sam bem conheci-

dos; este medicamento tem produzido optimos effeitos n'um caso de bocio. O dr. Coghill publica o seguinte interessante caso. Tratava-se de um bocio, de dimensões collossaes, que difficultava a deglutição, e a respiração. Praticou dezeseis injeções, o mais perto possível do tumor, *ao principio com dois centigrammas sómente de ergotina, e depois com seis.* O tratamento durou seis mezes: porem os resultados se tornaram apreciaveis desde os primeiros momentos. A dureza, e a tensão do tumor desapareceram rapidamente, diminuindo o volume; e facilitando-se muito tanto a respiração, como a deglutição. O lobulo esquerdo, que era o menor, de prompto adquiriu seu volume normal: e o direito diminuiu igualmente depois de novas injeções deste lado. Durante os dois mezes de tratamento, o doente enfraqueceu bastante; perdendo umas quatorze libras do seu pezo proximate, porem sem alteração alguma em sua saude, nem perda de força.

(*Nice med. e Journ. de pharm. e sc. acc. de Lisboa*).

O acido acetico no cancro—O Sr. Giees dá conta de um facto, em que o acido acetico aproveitou no tratamento desta terrivel affecção. Trata-se de um homem, de 62 annos, ao qual se haviam extrahido já varios tumores carcinomatosos do labio inferior e da lingua, e outros que tinham desaparecido debaixo da influencia do gelo.

Porem, tendo-se-lhe apresentado ultimamente um tumor, de rapido crescimento, proximo da glandula sub-maxiliar direita, o qual resistia ao tratamento pelo gelo, sendo canceroso, como o provou o exame histologico, feito em um pequeno pedaço, que se extrahiu para a experiencia, o dr. Giess ensaiou o seguinte tratamento.

Praticou no tumor uma injeção de acido acetico, e durante uma semana continuou injectando diariamente uma seringhinha de Pravaz cheia com um soluto de acido acetico na proporção de 1:3; nos primeiros dias a dose foi só um soluto a 3:9. Cada injeção era feita picando um só ponto, porem voltando a canula para todos os lados do tumor, de modo que atacasse grande parte d'elle. Depois se applicaram cataplasmas emolientes.

Uma consideravel inchação se produziu. Ao decimo dia se praticou uma incisão profunda com o bisturi, e se formou uma *drainage*, e