

questões administrativas relativas á hygiene ou ao ensino propriamente dito.

São estas as reformas capitaes, que instantemente exige o ensino medico, e que a Congregação da Faculdade da Bahia espera da illustração e patriotismo da Camara dos Deputados, e de sua sollicitude em promover os interesses superiores do paiz.»

CIRURGIA

QUATRO CASOS DE PREPUCIO ADHERENTE EM MENINOS

Pelo Dr. T. W. HALL

Tenho encontrado dentro do espaço de alguns annos, em trez meninos, com menos de 12 annos de idade, certos corrimentos pela urethra que me parecem ter algum interesse practico.

N'estes tres casos purgava a urethra um pus abundante, grosso e amarello, não havia phymosis nem demasiado cumprimento do prepucio e o meato urinario e suas visinhanças facilmente visiveis, mostravam-se vermelhos e inflammados, muito semelhantes ao estado de couzas que se nota em gonorrhéas especificas.

E é este o primeiro ponto que na clientela particular pode crear embaraço ao medico, pois a suspeita de se ter á vista, n'um caso d'estes, uma gonorrhéa precoce especifica é quasi inevitavel, e d'ahi pode resultar desagradaveis criminações á moral do menino e de seus conviventes.

No primeiro caso que observei durava já a molestia um mez, apesar de ter sido admiravelmente bem tratada com remedios internos, por um medico maranhense muito distincto.

Era n'um menino intelligente e precoce e de familia de alta posição na sociedade.

Por não haver phymosis nem tão pouco redundancia prepucial, não suspeitei, á principio, defeito algum do lado do prepucio e confesso que encarei e tratei o caso como se fosse de gonorrhéa especifica precoce, sem todavia assim o dar a entender aos paes do doente, e n'este tratamento continuei por alguns dias sem o minimo proveito.

Querendo então fazer uma ligeira cauterisação na glande para a cura da bulanite dei com adherencias assaz extensas entre a mucosa do prepucio e a superficie da glande na região da corôa; de sorte que as secreções abundantes deste logar não podiam ter facil esgôto.

Julguei que a irritação occasionada pelas secreções retidas produzira: 1.º balanitis, e que, 2.º esta inflamação gradualmente se propagára á urethra, causando assim a blenorragia, e pensei que se se destruisse as adherencias o mal deveria promptamente curar-se.

Resolvi, portanto, romper as adherencias, usando para este fim, não instrumento cortante, e sim uma simples tenta, ajudada pela tracção, e a parte da glaude correspondente ás adherencias ficou apenas ensanguentada e sarou dentro de alguns dias, por meio de abluções com agua e applicação de fios com glycerina. Depois d'isto toda a inflammação e purgação rapida-

mente desaparecerão sem outro tratamento, e não voltarão.

Poucos mezes depois d'este caso, vi outro semelhante, n'um menino de 8 a 9 annos; a mesma balanite e purgação, sem phymose, nem exuberancia prepucial.

N'este caso procurei logo as adherencias, e achando-as, do mesmo modo as destrui, e com este procedimento só cureu-se o menino completamente.

Encontrei aqui na Bahia um terceiro caso que foi tambem visto pelo meu amigo e distincto collega Dr. Paterson, e no qual a destruição das adherencias sem outro tratamento trouxe a rapida e completa cura do doente.

Finalmente no mez passado observei n'um menino de constituição debil e de pouco desenvolvimento physico, um engorgitamento e por fim suppuração, n'uma glandula inguinal esquerda: e n'este caso tambem havia as supra mencionadas adherencias e retenção das secreções sebaceas do penis, me parece que estas adherencias são analogas áquellas que com frequencia se notam entre os pequenos labios ou nymphas nos meninos, e que datão, portanto, de tenra idade, porém só mais tarde vem a occasionar symptomas de irritação quando o penis e suas secreções principiam a desenvolver-se.

As adherencias não erão muito fortes nem resistentes e existião mais para o lado da corôa do que do meato; não havia nada exteriormente que as denunciasse, e mesmo depois de arregaçado o prepucio podião passar desapercibidas á um exame ligeiro e rapido.